

四庫全書

子部

欽定四庫全書

普濟方卷三百四十一 明周王朱橚 撰

妊娠諸疾門

大便不通 附論

夫妊娠腸胃有風加之挾熱津液不足氣道否澀故令腸胃枯燥大便不通甚則呼吸奔喘腹脹乾嘔

方

羌活丸 治妊娠熱在臟腑大便秘澀

羌活

二兩半

大麻仁

三兩

檳榔

五枚

防風

枳殼

各一兩

大

黃

一兩半

木香

一兩

右搗羅六味為末與麻仁同研勻煉蜜和丸如梧桐

子大每服二十九溫水下食前服日三以微利為度

檳榔丸

治妊娠大便熱結旬日不通

檳榔

一兩

木香

半兩

大黃

二兩

青橘皮

焙半兩

牽牛子

二兩用一

半生一  
半炒

右為末煉蜜和劑更於日內塗酥杵勻丸如梧桐子

大每服二十九空心下溫水服

麻仁丸 治妊娠大便不通腹痛不能食養津液潤腸  
胃

大麻仁

兩四

人參

訶梨勒

兩各二

大黃

兩半

右先搗後三味為末次入麻仁煉蜜和劑更於臼內  
塗酥杵勻丸如梧桐子大每服三十九空心溫水下  
大便通即止

踈氣黃耆丸

治妊娠大便不通

黃耆 枳殼

各一兩

威靈仙

二兩

右為末用麵糊和丸如小豆大每服三十九溫水下不拘時未通稍加之

大棗湯

出永類鈴方

治妊娠臟燥悲傷欲哭伏如神靈伸欠

者

甘草

三兩

小麥

一兩

大棗

十枚

右咬咀每服半兩水二碗煎至一盞去滓溫服

治妊娠大便秘澀

出大全良方

枳殼

三兩防風

二兩甘草

炙一兩

右為細末沸湯點服一二錢日三

枳殼丸

治妊娠大便結塞不通臍腹脹不能安臥

氣上喘逆

枳殼

一兩半

大黃

二兩半

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九空心米湯下未通再服以通為度

潤腸丸 治妊娠大便不通腹脇堅脹

枳殼 大麻仁

各一兩

右研勻煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九食前溫水下生薑湯亦得

葱膠湯 治妊娠大便不通

葱白 牛皮膠

二觔

右以水一盞半煎令膠烊盡去滓頓服之

治虛羸大便秘

枳殼 製阿膠

炒等分

右為末煉蜜和劑杵三千下丸如梧子大別研滑石末為衣溫水下二十九半日來未通再服三十九加至五十九

小便不通

附論

夫妊娠小腸夾熱熱結胞內使氣道否澁故小便不通令人腹脇脹滿臍下急痛是其證也

方

茯苓湯 治妊娠小便不通



赤茯苓 白朮 郁李仁 杏仁 旋復花

各一兩

檳榔

五枚  
剉

右粗搗篩每服二錢匕水一盞煎至七分去滓空心服

大黃湯 治妊娠子淋小便不通

木通丸 治妊娠小便不通及轉胞臍下脹痛

木通 黃芩 冬葵子 生乾地黄

焙各二兩

右為末用麵糊和丸如梧子大每服二十九燈心湯

下食前服

冬葵子散 治妊娠小便不通小腹脹滿

冬葵子 榆白皮 滑石 阿膠

各二兩

右為散每服二錢匕溫水調服不拘時

四味葵根湯 治妊娠小便不通臍下滿痛

冬葵根 車前子 木通 阿膠

各三兩

右粗搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食

前溫服

鯉魚湯 治妊娠小便不利身重惡寒起則眩暈及水

腫

苦參丸 治妊娠小便難飲食如故

當歸

貝母

苦參

各三兩

滑石

半兩

右細末蜜和為丸如小豆大以米飲下二十丸不拘時

榆白皮散 治妊娠小便不通心神悶亂小腹急痛

榆白皮

王不留行

滑石

各一兩

右為細散每服二錢匕煎灯心湯調下

猪苓湯 治妊娠小便不通臍下鞭痛

猪苓 木通 桑根白皮

剉各一兩

右粗搗篩每服三錢匕水一盞入燈心同煎至七分去滓食前溫服

治妊娠小便不通臍下妨悶心神煩亂

葵子 榆白皮

切各一兩 葱白

七莖

右以水二大盞煎取一盞三分去滓分三服一方無葱白

又方

葵子

赤茯苓

蘧麥

已上各一兩

右搗細羅為散每服不計時候以溫水調下一錢

又方

葵子

滑石

寒水石

各一兩

右搗為散每服三錢水一盞葱白七寸煎六分去滓

無時候溫服

冬葵子散

治妊娠小便不利身重惡寒起則眩暈及

水腫妊娠小便不通

冬葵子

錢二

赤茯苓

錢二

右為末每服三錢米飲調服無時候利則住服如不通恐是轉胞加髮灰少許神效一方無茯苓有榆白皮昔有妊娠婦腹脹小便不利吐逆諸醫雜進溫脾胃寬氣去脹等劑服之反吐藥物不納轉加脹滿揍心驗之胎死腹中又脹諸下胎藥不能通解舉家憂惶因得鯉魚湯論曰腳腫俗呼為皺腳亦有通身腫

滿心胃急脹名曰胎水遂去妊婦心前衣服看之胃  
肚不分急以鯉魚湯三五服大小便皆下惡水腫消  
脹去方得分娩死胎可謂更生之人矣此證蓋緣懷  
身腹大妊婦不自知覺人人皆以為身娠如此不以  
為胎水病醫人何以得知故此書論病須自家覺察  
大腸與膀胱水不出入淋瀝急數尿時痛大便赤裏  
急如痢以手按胃間至臍方可出不然小便逆上出  
而不禁其浮腫先以涼藥疎利却用上藥

治妊娠卒然小便不利

滑石末

杏仁等分

右先搗杏仁令爛次入滑石末以軟餅搗和為丸如小豆大每服二十九葱白湯送下

療妊娠卒不得小便

用杏仁二十箇去皮尖熬令變色搗丸如豆大燈心煎湯吞七粒得利

又方



以滑石末水和泥臍下二寸小便即利未利更塗之

又方

用車前草汁調滑石末塗臍四畔方四寸熱即易之

治妊娠小便不通臍下妨悶心神煩悶

用紫苑去苗為末井花水調下二錢一方用紫草蔓荊實散 治妊娠小便澀不通利

用蔓荊實二兩搗羅為散每服二錢溫水調服空  
心午前各一服衛生寶鑑濃煎葱白湯調下

治妊娠卒小便不通

蔓菁子

右搗細羅為散每服不計時候煎葱白湯調下一錢  
治妊娠小便不利方

用蕪菁子七合為末水和服方寸匕日三

治妊娠遍身浮腫喫前方未得全效小便未得通快宜

服此方若遍身不腫止小便不通一兩日亦可服此  
藥一二盞

山梔 知母 前胡 升麻 麥門冬 冬葵子  
葶藶 桔梗

右細杵羅為末每服三錢水一盞二分葱白五枝同  
煎取一盞食後和滓喫

遺失不禁

夫腎主水入胞為小便腎氣和乃能約制洩出以時

若妊娠腎虛胞冷不能約制故小便利下而多也其證  
令人背項憎風少腹急痛治法當加以扶養胎氣之劑

方

熟乾地黄丸 治妊娠小便不禁臍腹疼痛

熟地黄 巴戟天 肉蓯蓉 五味子 山茱萸

菟絲子 萆薢 蜀椒 山芋 續斷 菟絲

子 杜仲 沉香

右為細末煉蜜和丸如梧子大每服十五丸食前溫

酒下

椒菊丸 治妊娠小便日夜頻數

蜀椒 甘菊花 肉蓯蓉 菖蒲 巴戟天 遠

志 黃耆 附子

右為細末酒煮麴和丸如桐子大每服二十九空心  
食前溫酒下

菟絲子丸 治妊娠小便利日夜無度

菟絲子 菖蒲 肉蓯蓉 蛇牀子 五味子

防風 遠志

右為末煉蜜和九搗三百杵九如桐子大每服十九  
空心溫酒下

溫氣除寒補下丸 治妊娠小便利

葫蘆巴 龍骨 菖蒲 遠志 補骨 益智

肉蓯蓉

右為細末煉蜜和九如桐子大每服三十九空心溫  
酒下

桑螵蛸丸 治妊娠小便滑數

桑螵蛸 人參 鹿茸 黃耆 牡蠣粉 甘

草

右搗粗篩每服三錢水一盞生姜一片棗二枚擘煎  
至七分去滓食前溫服

鷄脆脰散 治妊娠遺尿

鷄脆脰 熟乾地黃 當歸 牡蠣粉 黃耆

厚朴

右搗羅為散每服二錢匕食前溫酒調下

鹿茸丸 治妊娠下焦冷氣小腹疼痛小便多

鹿茸

一兩

白龍骨

三分

桑螵蛸

半兩

牡蠣粉

二兩

右為末酒煮麵糊和丸如梧子大每服二十九空心

食前溫酒下

艾葉丸 治妊娠小便利小腹痛

艾葉

灸

乾姜

各一兩

厚朴

益智

各半兩

右為末煉蜜和丸如桐子大每服三十九米飲湯下



以飯壓之

秦椒丸 治姙娠小便利

秦椒

六兩

懷子

炒一兩

黃蠟

四兩

右搗羅二味末鎔蠟和丸如桐子大每服二十九空心用溫酒下

白薇散 治姙娠小便無度尿不知出時胎滿故也

白薇

白芍藥

各一兩

右搗羅為散每服一錢匕食前溫酒調下日三

鷄翎酒 療妊娠尿不知出時胎滿故也

用鷄子燒灰末之酒調方寸匕

桑螵蛸散 治妊娠小便不禁

用桑螵蛸十二箇炙為細末每服三錢空心食前  
米飲調下

治小便利

燒遺尿人薦草灰服之瘥

治小便遺失

阿膠

三錢

牡礪

四錢

鹿茸

四錢

右判末挑三錢水一盞半煎至一盞空心服或米飲

調亦得

瘧疾

附論

夫妊娠病瘧者由夏傷於暑客於皮膚至秋因勞動血氣腠理虛而風邪乘之動前暑熱陰陽交爭陽乘則熱陰盛則寒陰陽相雜寒熱俱歇若邪動氣至交爭則發故瘧休作有時其發寒時節漸晏者此由風邪客於風

府循脊而下衛氣至一日一夜常大會於風府故發日  
晏其發日早者衛氣之行風日夜下一節二十一日至  
尾骶二十二日入脊內上注於伏衛之脉其行九日出  
缺盆之內其氣既止故發更早其間日發者由風邪內  
搏五臟橫連募厚其道遠其氣深其行遲不能日作故  
間日蓄積乃發也妊娠而發則寒熱之氣相迫傷於胎  
故多損動也 又云凡懷孕婦人病瘧可煎白虎湯小  
柴胡柴胡飲子等藥如大便結梗可用大柴胡湯微通

利之不可大吐瀉恐傷其孕也經曰夏傷於暑秋必病瘧

方

松羅散 治妊娠患瘧發時增寒壯熱口乾多吃冷水腹內疔刺疼痛不止

松羅

半兩

鱉甲

半兩

恒山

半兩

烏梅肉

七枚

朱砂

漢防己

各一兩

澤瀉

半兩

麥門冬

一兩

知母

連翹

各半兩

黃丹

石葦

虎杖

各一分

生乾姜

一兩

右搗細羅為散每服不計時候以溫酒調下二錢

清脾湯 治妊娠作瘧熱多者

青皮 厚朴 白朮 草薢仁 柴胡 茯苓

半夏 黃芩 甘草 人參

各等分

常山

半

右剉散每服四錢生姜五片真地骨皮少許煎不時溫服或加麥門冬去心二十粒未效宜服勝金丸

阿膠散 治妊娠患瘧發時增寒壯熱頭目眩暈不思

飲食

阿膠

一兩半

赤芍藥

當歸

柴胡

黃芩

白茯苓

苓

白朮

各一兩

麥門冬

一兩半

甘草

半兩

右搗篩為散每服四錢水一盞入薤白二莖煎至六

分去滓不計時候溫服

人參散

治妊娠瘧疾頭疼增寒壯熱面黃不思飲食

人參

知母

麥門冬

柴胡

桑寄生

白茯苓

苓

厚朴

各一兩

甘草

半兩

右搗篩為散每服四錢水一盞煎至六分去滓不計

時候溫服

驅邪散 妊娠瘧疾者謂何蓋榮衛虛弱脾胃不足或感風寒或傷生冷轉成瘧疾急服驅邪散莫待吐逆見食不思卒難醫療

高良姜 白朮 草薢仁 橘紅 藿香葉 縮

砂仁

白茯苓

各一兩

甘草

炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞半生姜五片棗一枚煎至八分去滓不拘時候



七寶散 治男子婦人一切瘧疾或先寒後熱或先熱後寒或寒多熱少或熱多寒少一日一發或一日兩三發或連日或間日發或三四日一發不問鬼瘧不伏水土山嵐瘴氣似瘧者亦治婦人妊娠六七月而患瘧疾皆可服之

常山 厚朴 青皮 陳皮 甘草 檳榔 草

菓 去皮各等分

右咬咀每服半兩於未發隔夜用水一碗酒一盞煎

至一大盞漚出露一宿却將滓再用酒水更依前煎  
一次去滓別以碗盛貯亦露一宿來日當發之早盪  
溫面東先服頭藥少歇再服藥滓大有神效嘗治一  
姪婦六七個月而沾癰疾先寒後熱六脉浮緊衆醫  
用藥柴胡桂枝無效因言此疾非常山不愈也衆醫  
不肯因循數日病難無計毘勉治之遂用七寶散一  
服愈黃帝問曰婦人重身毒之奈何岐伯曰有故無  
殞帝曰願聞其故何謂也岐伯曰大積大聚其可犯

也裏其大半而止豈不以審藥之性味明治療之方處以中痛與疾適好於半而止之勿過而於則何疑余攻治哉

當歸散 治妊娠患瘧憎寒體顫

當歸 白芍藥 茯苓 枳殼 白木

各一兩

鱉甲

一兩 甘草

剉一兩

右搗篩為散每服四錢水一盞煎至六分去滓不計時溫服

知母散 治妊娠瘧疾憎寒壯熱口乾煩悶

知母 白茯苓 麥門冬 柴胡 烏梅 大

各一兩 各一分

青 甘草

各半兩

右搗篩為散每服四錢水一盞煎至六分去滓不計

時候溫服

治妊娠患瘧疾湯

恒山 甘草 黃芩 烏梅 石膏

二兩 一兩 三兩 十四枚 八兩

右咬咀以酒水各一升半合漬藥一宿煮三四沸去

滓初服六合次服四合後服二合九三服一方有麥冬去心一兩無石膏名恒山散忌海藻松菜生葱

黃芩散

治妊娠婦患瘧疾寒熱頭痛心煩

黃芩

麥門冬

各一兩

石膏

二兩

甘草

半兩

烏梅

十四個

右咬咀每服四錢水一盞煎至六分去滓溫服不計

時候

烏梅散

治妊娠瘧疾寒熱頭疼煩渴

烏梅

黃連

桑寄生

人參

甘草

各一兩

右搗篩為散每服四錢以酒一盞煎至六分去滓不計時候溫服

治妊娠患瘧疾湯

恒山

竹葉

各三兩

石膏

八兩

粳米

一百粒

右咬咀以水六升煮取二升半去滓分三服第一服於未發前一食頃服之第二服臨欲發服之餘一服用以塗頭額及胃前五心藥滓置頭邊當一日勿近水及進飲食過發後乃進粥食忌生葱菜

鱉甲散 治妊娠瘧疾寒熱腹痛

鱉甲

一兩半

乾姜

半兩

當歸

一兩

桃仁

三分

右搗細羅為散每於發時用前水調下一錢

黃連散 治妊娠瘧疾寒熱腹痛

黃連

一兩

當歸

一兩

微炒

右搗篩為散每服三錢以水一盞煎至六分去滓不

計時候溫服

驅邪散 治妊娠傷寒變成瘧疾腥脾者何答曰榮衛

虛弱脾臟受濕發傷寒既愈轉成瘧疾急服莫待吐  
逆見食不思卒難醫療

用良姜一兩半以猪膽汁浸一宿用東壁土炒焦去  
土洗切焙之以北棗一枚先焙令乾碾同前藥為  
末二錢水一盞煎至五分候瘧發時便服為妙一  
方為圓紫蘓湯下二十圓

頭目旋暈

附論

夫妊娠頭旋目暈視物不見顯項腫核者蓋因胎氣有



傷肝臟毒熱上攻太陽穴痛嘔逆背項拘急致令眼暈  
生花若加涎壅危在片時急煎消風散服之

方

消風散 治妊娠肝臟熱毒上攻太陽穴胃膈涎壅頭  
旋目暈視物不見顙項腫核

石膏 甘菊花 防風 荆芥穗 川羌活 羚羊

羊角 川芎 大豆黃卷 當歸 白芷 各一兩 甘

草 炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞半入好茶半錢煎至八分  
去滓通口服食後昔有一妊婦將臨月兩眼忽然失  
明燈火不見頭疼目眩項顛腫滿不能轉頸請醫治  
不瘥轉加危困服此方獲安分娩其眼帶吊起人物  
不辨服四物湯加荊芥防風更於眼對四十九轉轆  
闕證服天門冬飲子以此三藥間服日漸稍明大忌  
酒麵煎炙燒燂鷄羊鵝鴨豆腐辛辣一切毒食并房  
勞及稍溫藥

天門冬飲子 治妊娠肝經風熱上攻眼目帶帛失明

天門冬 知母 羌蔚子 防風 五味子

各一兩半

茯苓 川羌活 人參

各七錢半

右咬咀每服四錢水一盞半姜三片煎至八分去滓  
食後溫服忌燒燂辛辣毒食物及稍溫藥如其不然  
眼不復明也雖服三五個月至半年周歲未愈不服  
終為盲人矣蓋此證為懷身娠多居密室火閣衣著  
裊褥厚蓋伏熱在裏或服補藥因食熱物太過致令

胎熱肝臟壅極風衝入腦所致

瀉肝散 治妊婦將臨月兩眼忽然失明燈火不見頭

痛目暈項顙腫滿不能轉頸

麥門冬

一兩

大黃

黃芩

細辛

芒硝

四味各半兩

玄

參 桔梗

二味各五錢半

右為末每服挑四錢水一盞半煎八分食後溫服此

方雖非治產難乃慮後人得此證不諳此理誤服補

藥并毒食冒犯禁忌失一身之寶可不惜哉故附之

耳

消風散 治妊娠頭旋目暈視物不明顙項腫核者何

答曰蓋因胎氣有傷肝臟毒氣上攻太陽穴痛嘔逆  
背項拘急致令眼暈生花若加涎壅危在片時

石膏 山茵陳 菊花 防風 荆芥 螺粉

六味

錢各二 白芷 川芎 阿膠 甘草

四味各二錢

木香

白朮

各半錢

計一兩五錢剉作六服水一盞入好茶半錢煎八分

通口服頭微汗得瘥

痰逆不思食

附論

夫水飲停積結聚為痰人皆有之不能為害若多則成病妨害飲食乃至嘔逆妊娠之病若嘔逆甚者傷胎也

方

白朮散 治妊娠心胃痰逆煩悶頭重目眩憎寒惡聞食氣四肢無力

白朮 人參 葛根 赤茯苓 陳橘

各一兩

枇杷

葉 枳殼 黃耆 柴胡 麥門冬 甘草 半

夏已上各半兩

右搗篩為散每服三錢水一盞生姜半分煎至六分去滓不計時候溫服

枳實散 治妊娠氣壅心胃不利痰逆不思飲食

枳實三兩 人參 陳橘皮 麥門冬 赤茯苓各三分

半夏 甘草 藿香 枇杷葉各半兩

右搗篩為散每服三錢水一盞生姜半分煎至六分

去滓不計時候溫服

人參飲子 治妊娠痰逆不思飲食

人參

生薑

切各半兩

陳橘皮

一兩湯浸

右件藥以水一大盞煎取八分去滓不計時候分煖  
三服

嘔逆不下食 附論

夫妊娠嘔逆者由胃氣逆胃為水谷之海其氣不調而有風冷乘之冷搏於胃氣胃氣逆則令嘔逆也 妊娠



之人脾胃氣弱風冷乘之則中焦否隔胃中虛滿其氣上溢氣不下降故雖食飲卒不得下甚則嘔逆

方

白朮散 治妊娠嘔逆不下飲食胃膈煩悶

白朮

一两

木香

青橘皮

各半兩

丁香

麥蘖

人參

赤茯苓

各一两

甘草

炙

檳榔

各半兩

乾姜

一分炮製

右搗篩為散每服二錢匕入鹽少許沸湯點沸不計

時候服

枇杷葉散 療妊娠心胃氣滯嘔吐不下飲食神虛煩

四肢少力

枇杷葉 半夏 麥門冬 人參 甘草

各半兩

訶

子肉

藿香

各一兩

枳殼

陳皮

各三分

右咬咀每服三錢水一盞姜三片棗一枚煎至七分

去滓溫服一方無大棗訶子

人參散 治妊娠嘔逆不下飲食四肢少力頭疼憎寒

人參

三分

柴胡

一兩

白朮

三分

甘草

半兩炙

麥門冬

一兩

陳橘

皮 白茯苓

兩一

葛根

兩一

半夏

兩半

三分

右搗篩為散每服三錢水一盞生姜半分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服

前胡散

治妊娠胃中滿悶嘔逆不下食四肢疼痛

前胡

兩一

麥門冬

兩一

人參

兩一

赤芍藥

兩半

陳橘皮

兩一

半

夏

兩半

枳殼

兩半

甘草

兩半

炙

右搗篩為散每服三錢水一盞生姜半分淡竹葉二十七片棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服

茅根散 治妊娠嘔逆不食心煩微渴

茅根

三分

人參

一分

半夏

兩半

陳橘皮

三分

葛根

兩半

赤茯苓

一兩

藿香

兩半

甘草

一分

右搗篩為散每服三錢水一盞生姜半分棗二枚煎至六分去滓不計時候溫服

訶梨散 治妊娠氣攻心腹疼痛嘔逆不下食四肢不

和

訶梨勒

陳橘皮

各一兩

白朮

芎藭

各三分

厚朴

一兩

人參三分 白茯苓一分 當歸兩半

右搗篩為散每服三錢水一盞生姜半分棗三枚同煎至六分去滓不計時候溫服

白豆蔻散 治妊娠胃氣虛冷嘔逆不下食腹脇脹滿四肢不和

白豆蔻兩 陳橘皮 人參 白朮 厚朴各三分 芎

藟三分 半夏三分 甘草一分

右搗篩為散每服三錢水一盞生姜半分棗三枚煎

至六分去滓不計時候溫服

人參散 治妊娠嘔逆頭痛不納飲食寒熱心膈壅悶

人參 前胡 細辛 赤茯苓 厚朴 芍藥

各一

兩甘草 半半夏 三分

右搗篩為散每服三錢水一盞生姜半分煎至六分去滓不計時候溫服

訶梨勒丸 治妊娠心煩頭目眩悶聞食氣即嘔逆

訶梨勒皮 一人參 赤茯苓 半夏 葛根 甘

草

各半兩

枳殼

三分白朮

一兩

右搗羅為末煉蜜搗三二百杵丸如梧桐子大每服

不計時候以生姜粥飲下二十九

枇杷葉湯

治妊娠嘔逆不下食心腹滿悶脇肋疼痛

枇杷葉 高良姜 半夏 陳橘皮 丁香 甘

草 檳榔

剉各一兩

右粗搗篩每服三錢水一盞入生薑五片煎至六分

去滓稍熱服

厚朴湯 治妊娠嘔逆不下食

厚朴 人參 白茯苓 白朮 陳橘皮 竹茹

半夏 各一兩

右粗搗篩每服三錢水一盞生姜三片煎至七分去

滓食前溫服

七物飲 治妊娠嘔吐惡食

淡竹茹 人參 桔梗 前胡 半夏 白茯苓

各一兩 茅根 三分



右劉如麻豆大拌勻每服五錢水一盞半生姜三片棗三枚劈破煎至八分去滓溫服

竹茹湯 治妊娠擇食嘔吐頭疼眩暈顛倒痰逆煩悶

四肢不和並宜服之

又竹茹湯 治妊娠至三四月嘔吐不食

生蘆根一兩青竹茹 橘皮 前胡各四錢生姜五片大

腹皮 檳榔各二兩

右每服四錢水一盞煎至六分空心溫服

生姜散 治妊娠嘔逆不下食和胃順氣

生姜

一分

姜黃

陳橘皮

白芷

白朮

甘草

各半

灸兩

右搗羅為散每服二錢用粥飲調下不計時候

扶神湯

治妊娠嘔逆不下食升降陰陽和調胃氣

扶神

黃耆

人參

白朮

各半兩

藿香葉

甘草

灸各二錢

右粗搗篩每服二錢水一盞入生姜三片煎至六分

去滓食前溫服

陳橘皮散 治妊娠嘔逆不下食

陳橘皮

二人

麥門冬

厚朴

白茯苓

各一兩

白朮

半兩

右搗篩為散每服四錢水一盞入生姜半分淡竹葉  
二七片煎至六分去滓不計時候溫服

藿香散 治妊娠嘔逆食物不下

橘皮

竹茹

人參

白朮

各十銖

生姜

一兩

厚朴

二兩

銖

右呖咀以水七升煮取二升半分三服不瘥重作忌

桃李雀肉

豆寇丸 治妊娠嘔逆不下食和調胃氣

草豆寇

白朮

各一兩

人參

一兩半

陳橘皮

去白焙一兩

半

夏

半兩

右為末用棗肉為丸如梧桐子大每服二十九生姜湯下不計時候溫服

人參湯 治妊娠嘔逆不下食和胃氣利胃膈

人參 山芋 白茯苓 陳粳米 各一兩 半夏 半兩

右搗篩每服三錢水一盞入生姜五片棗三枚劈破同煎至六分去滓不計時候溫服

柴胡湯 療妊娠不欲食或吐春月所宜服

甘草 柴胡 各二兩 麻黃 一兩 吳茱萸 半兩 大棗 十二枚

右細切以水六升煮取三升適寒溫服一升日三服食噫醋除熱下氣所宜多與上同但秋夏去茱萸加

枸杞一觔六月小麥一升石膏三兩秋去石膏加甘草一兩九月去麻黃加乾姜一兩十月加川芎三分

忌海藻松菜

蘆根散 治妊娠嘔逆煩悶不下食

蘆根

一兩半

甘草

半兩

人參

一兩

麥門冬

一兩半

陳橘皮

一兩

右搗篩為散每服三錢水一盞入生姜半分淡青竹

葉二七片小麥一百粒煎至六分去滓不計時候溫

服

療妊娠嘔吐飲食兼吐痰水

生蘆根

一分

橘紅

四分

生姜

六分

檳榔

二分

右切以水二盞煮取七合空心熱服

乾姜人參半夏丸 治妊娠嘔吐不止

乾姜

人參

各一兩

半夏

二兩

右為末以生姜汁糊為丸如梧桐子大每服十九日

三服

治妊娠兩三月間食臭嘔逆不下食肌肉黃瘦宜吃此

方若大腑秘熱即可喫此藥自別有方

藿香 黃橘皮 人參 厚朴 防風 川芎

當歸

各一兩

麥門冬

四錢

甘草

四銖

右細杵羅為末每服二錢水一盞生姜二片棗二枚  
同煎九分空心服

香朮散 治婦人五六月胎孕胃腹間氣刺痛或腸鳴

嘔吐減食此由喜怒憂思過度飲食失節

蓬朮

煨一兩

丁香

半兩

粉草

一兩



右為細末每服一錢空心鹽湯點服覺胃內按下之  
壯音有一婦患妊娠嘔吐不止粥藥不下衆醫袖手  
吉安醫官用以此藥一服見效後以治心脾疼痛嘔  
逆之証不問男女服之良驗

咳嗽喘急

附論

夫肺感於寒寒傷於肺則成咳嗽也所以然者肺主氣  
而外合皮毛毛竅不密則寒邪乘虛而入故肺受之也  
五臟六腑俱受氣於肺以其時感於寒而為嗽也秋則

肺受之冬則腎受之春則肝受之夏則心受之其諸臟嗽不已則傳於腑妊娠病久不已者則傷胎也 又曰

妊娠咳嗽者以肺感寒氣而然也經謂形寒飲冷則傷肺故傷則咳久咳不已則寒氣相移寒氣相移則不惟孕育有傷而肺氣痿弱皮毛枯悴矣治之之法固宜發散寒邪又須資補胎氣寒邪去胎氣安則咳嗽自己也

妊娠喘急兩脇刺痛脹滿者何蓋因五腑不利氣血虛羸因食生冷或發憎寒唇青面白筋脉拘攣骨節痠

痛皮毛乾澀上氣喘急大便不通嘔吐頻頻平安散主之

方

丁香半夏湯 治妊娠咳嗽不止消痰逆和胃氣

丁香 木香 半夏 各半兩 人參 白朮 桔梗

白豆蔻 陳橘皮 甘草 檳榔 前胡 赤茯苓

苓 各二兩

右粗搗篩每服三錢水一盞生姜三片煎至六分去

滓不計時候溫服

馬兜鈴散 治妊娠胎氣壅滯咳嗽喘急

馬兜鈴 苦梗 人參 甘草 貝母 陳皮

各半兩

大腹皮 紫蘓 桑白皮 五味子

各一兩七分

右咬咀每服四錢水一盞姜三片煎至七分去滓無

時溫服

訖胡湯 治妊娠咳嗽胃滿氣急減食

訖胡 一兩 桃仁 半兩 天門冬 三分 麥門冬 甘草 白茯苓

兩

兩

分

苓 山芋 黃耆 阿膠 人參

各一兩

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至六分去滓不計時

候溫服

桔梗散 治妊娠肺壅咳嗽喘急不食

天門冬

一兩

桑白皮

苦梗

紫蘘

各半兩

赤茯苓

一兩

廣麻黃

三分

貝母

人參

甘草

各半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜三片煎至七分去滓無

時溫服

鹿角膠散

治妊娠心胃妨悶兩脇微痛煩渴咳嗽

鹿角膠

一兩

麥門冬

貝母

三分

陳橘皮

一兩

細辛

三分

前

胡

一兩

甘草

半兩

赤茯苓

一兩

芎藭

半兩

右搗篩為散每服四錢水一盞煎至六分去滓無時

稍熱服

麥門冬散

治妊娠煩渴嗽口苦

赤茯苓

知母

黃耆

白茅根

人參

百合

各一兩

甘草

半兩

麥門冬

一兩

去心

右搗篩為散每服四錢水一盞葱白五寸煎至六分  
去滓不計時候溫服

貝母散 治妊娠肺損咳嗽喘促不食

貝母 鹿角膠 生乾地黄 麥門冬 人參

黃耆 五味子 已上各一兩 甘草 半兩

右搗細羅為散每服不計時候糯米粥飲下二錢

鱉甲散 治妊娠咳嗽羸瘦不能下食

鱉甲 貝母 人參 木香 柴胡 桔梗 五

味子

已上各一兩

甘草

半兩

右為細末煉蜜和搗二三百杵丸如桐子大每服不

計時候以糯米粥飲下三十丸

荊芥飲

治妊娠感風冷咳嗽痰壅頭昏痛

荊芥穗

旋復花

前胡

三兩

芍藥

半夏

甘草

一兩麻黃

半兩

右粗搗篩每服三錢水一盞生姜三片煎至六分去

滓不計時候溫服



百合散 治妊娠咳嗽心胃不利煩悶不食

川百合 紫苑 麥門冬 苦梗 桑白皮

各一兩

甘草

半兩

右咬咀每服四錢水一盞竹茹一分煎至六分去滓入蜜半匙更煎至三沸不拘時溫服

紫苑湯 治妊娠咳嗽不止胎不安

甘草

杏仁

各一兩

紫苑

一兩

桑白皮

一兩

苦梗

三分

天門

冬

一兩

右咬咀每服三錢水一盞竹茹一塊煎至七分去滓  
入蜜半匙又煎二沸溫服一方有麥門冬無天門冬  
桑白皮九 治妊娠咳嗽痰盛喘逆

桑白皮

二兩剉

半夏

阿膠

人參

各一兩

丹砂

研一分

甘草

炙半兩

右搗羅為末糯米粥為丸如鷄頭實大每服一九食  
後臨臥時含化嚥津

阿膠散

治妊娠心胃妨悶兩脇微疼煩渴咳嗽

阿膠 麥門冬 款冬花 貝母 秦艽

各一兩 甘

草

半兩

右搗篩為散每服三錢水一盞煎至六分去滓不計

時候溫服

紫苑散 治妊娠咳嗽氣急心煩不食

紫苑 桑根白皮 貝母 陳橘皮

已上各一兩

燈心

甘草

半兩

右搗篩為散每服四錢水一盞生姜半片棗三枚煎

至六分去粗不計時候溫服

又方

出聖惠方

桑根白皮

三分

款冬花

三分

赤茯苓

三分

青橘皮

兩半

枇杷

葉

兩半

木通

三分

右搗篩為散每服四錢水一盞生姜半分煎至六分去滓不計時候溫服

紫蘇散

治妊娠氣壅咳嗽胃膈不利吃食減少

紫蘇葉

赤茯苓

前胡

陳橘皮

貝母

已上一各一

甘草 半兩  
炙

右搗細羅為散每服不計時候以糯米粥飲調下二

錢

槐豆散 治妊娠咳嗽及安胎氣

槐豆 當歸 貝母 芫薺 人參 各一兩

右搗羅為散每服二錢匕溫酒調下日三

前胡湯 治妊娠咳嗽胃膈不利痰涎壅悶

前胡 和皮大腹 半夏 陳橘皮 甘草 各一兩  
炙

右粗搗篩每服三錢水一盞生姜三片同煎至六分  
去滓食後臨臥溫服

百合散 治妊娠心胃氣壅喘促咳嗽

百合 桑根白皮 瓜蒌根 甜葶藶 甘草

右搗篩為散每服三錢水一盞入葱白五寸煎至六分  
去滓不計時候溫服見效

人參散 治妊娠咳嗽

人參 陳橘皮 甘草 生姜

右搗羅為散每服二錢沸湯調下

防已湯 治妊娠咳嗽喘滿短氣

防已 白藥子

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服未  
效再服之

白朮湯 治妊娠咳嗽痰盛嘔逆

白朮 半夏

右粗搗篩每服三錢水一盞生姜三片同煎半盞去

滓食後溫服日三見效

車脂方 療妊娠咳嗽熱病及治腹痛

以車轄燒赤投酒中候冷飲之良效

又方

用貝母去滓剉炒令黃為末砂糖研爛拌和勻丸  
如鷄頭子大每服一九含化神效

治婦人妊娠咳嗽

以蒲草搗篩蜜丸服之立效冬月採根用亦差



平安散 治妊娠上氣喘急兩脇刺痛腹脹滿

厚朴

生薑

各二錢

乾姜

陳皮

去白一錢

川芎

半錢

木香

二分 乾地黄

洗一錢半

甘草

炙四錢

右咬咀每服四錢水一盞半入燒鹽一捻煎至一盞  
去滓通口服不拘時服甚者只三服一方無川芎以  
上諸證蓋因五臟不利氣血虛羸因食生冷或發憎  
寒唇青面白筋脉拘攣骨節痠疼皮毛乾澀上氣喘  
急大便不通吐嘔頻頻

圓參阿膠煎 治妊娠肺氣不足寒壅相交痰唾稠粘咳嗽不已

人參 阿膠 五味子 紫苑

各二兩

右為細末煉蜜和丸如櫻桃子大食後含一九嚥津服

治妊娠咳嗽

燒車釭脂末內酒中服

痰飲

附論

夫痰飲者由氣道滯水飲停積結聚而不散令人膈  
皖痞悶嘔逆惡心體重多唾不思飲食妊娠痰飲不可  
專以破痰逐飲之劑故昔人論諸病痰飲者當以溫藥  
和之

方

前胡湯 治妊娠痰飲留滯不思飲食

前胡

去蘆頭  
剉一兩

半夏

二兩以生薑自  
然汁一升拌炒

人參

一兩

厚朴

枳殼

旋覆花

各半兩

木香

一兩

陳橘皮

桔梗

炒各半兩

赤茯苓

去黑皮剉

白朮

各一兩

甘草

三分

右粗搗篩每服三錢匕水一盞入生姜五片煎至七分去滓不計時候溫服

白朮散

治妊娠痰盛止嗽寬膈和氣進食

白朮

一兩

人參

二兩

白茯苓

三分

黃耆

姜製半夏

各一兩

山芋

桔梗

桑根白皮

白芷

五味子

各半兩

甘草

一分微炙

右搗羅為散每服二錢匕沸湯點食後臨臥服

利膈九 治妊娠痰飲嘔逆惡心

半夏

三兩 前胡

去蘆頭 一兩

赤茯苓

檳榔

百合

陳

橘皮

訶梨勒

桔梗

枳殼

人參

各半兩

右為細末水煮麵糊和丸如梧桐子大每服十五丸至二十九食後溫生姜湯下

黃耆湯

治妊娠痰逆和脾胃思飲食

黃耆

判一兩

半夏

半兩

芎藭

半兩

甘草

炙一分

人參

白朮

陳橘皮

赤茯苓

枳殼

訶梨勒皮

各三分

右粗搗篩每服二錢水一盞入生姜三片棗一枚劈  
同煎至六分去滓溫服不拘時

丹砂沉香丸 治妊娠痰壅不思飲食

丹砂 沉香 肉豆寇 半夏 各一兩 湯浸 人參 三分 丁

香 三分 白茯苓 陳橘皮 甘草 檳榔 劉各 半兩

右除丹砂外搗羅為末入丹砂研半勻煉蜜和丸如  
梧桐子大每服十五丸生姜湯下食前服

款冬花散 治妊娠心膈痰壅肺氣不順咳嗽頭疼

款冬花 麻黃 貝母 前胡 桑白皮 紫苑

各半  
兩 旋覆花 白朮 甘草 石膏  
各一  
兩

右咬咀每服四錢水一盞姜三片煎至七分去滓溫

服食後一方有白朮無白朮

半夏湯 治妊娠痰飲下消嘔逆不食及中煩悶惡聞

食氣頭眩重四肢百骨節疼痛

半夏 人參 芎藭 赤茯苓 桑白皮

生乾地黄 芍藥 陳橘皮 甘草  
各三  
兩 一  
兩

炙半

兩

右粗搗篩每服四錢水一盞入生姜半分煎取七分

去滓溫服不拘時候

旋覆花湯 治妊娠痰飲胃膈不利 思飲食

旋覆花

枳殼

兩各半

半夏

木通

兩各一

前胡

兩二

白

朮

赤茯苓

陳橘皮

檳榔

兩各六

右粗搗篩每服五錢水一盞半入生姜五片煎至八

分去滓空心服午后再服此藥利胃膈行滯氣消痰



飲藥脹滿極效有風痰人常宜服一方有甘草炙三錢

麻黃散 治妊娠外傷風冷痰逆咳嗽不食

麻黃 陳皮 前胡 半夏 人參 白朮

各一兩

枳殼 貝母 甘草

各半兩

右㕮咀每服四錢蔥白五寸姜半分棗二枚水一盞煎至六分去滓溫服

赤茯苓湯 治妊娠痰飲不除胃脇支滿嘔逆不思飲

食漸加羸瘦

赤茯苓 前胡 白朮 紫蘘各半 半夏 大腹

皮 人參 麥門冬各半

兩

右粗搗篩每服四錢水一盞半入生姜半分煎取八分去滓不計時候溫服

木香丸 治妊娠痰飲咳嗽嘔逆不思飲食

木香 甘草 白朮 陳橘皮各一 天南星 半

兩

夏 白芷 乾姜一分

右為末同粟米飲為丸如梧桐子大每服二十九食  
後煎生姜棗湯下

人參丸 治妊娠痰盛調脾胃進飲食

人參 高良姜 白茯苓 陳橘皮 厚朴

各一兩

半夏

二兩

乾姜

甘草

炙各半兩

右為末用生姜汁浸蒸餅心和劑為丸如梧桐子大  
每服三十九食後臨臥生姜湯下

百合散 治妊娠風壅相交咳嗽痰多心胃滿悶

百合 紫苑茸 貝母 白芍藥 前胡 赤茯苓

苓

桔梗

各一兩

甘草

生半兩

右咬咀每服四錢水一盞半姜五片煎至八分去滓  
溫服不拘時候

麥門冬湯 治妊娠痰逆不思飲食止煩渴定咳嗽

麥門冬

半夏

貝母

炮各半兩

青橘皮

乾姜

甘

草

炙各一兩

右粗搗篩每服三錢生姜三片水一盞慢火煎至七

分去滓通口空心食前服

天南星丸

治妊娠痰飲膈腕痞悶嘔逆惡心

天南星

半夏

二味并去臍用生薑自然汁浸三宿細切焙乾用

人參

白茯苓

各一兩

白礬

一兩半

右搗羅四味為末入白礬和藥再研令勻用生薑汁煮麵糊軟硬得所和丸如梧桐子大每服十五丸熱水下空心日午晚食前各一服

乾姜丸

治妊娠痰飲浸漬膈腕目運頭旋

乾姜 白礬 芎藭 半夏 白朮

各一兩 二兩

右為末煮棗肉和丸如小豆大每服十五丸溫淡生

姜湯下不計時候服

枳殼丸 治妊娠痰盛嘔逆惡心頭目旋運

枳殼

四兩

乾姜

二兩

白朮

三兩

半夏

二兩

右為末生薑汁煮麵糊和丸如梧桐子大每服十五丸溫米飲下食前服漸加至二十九丸

妊娠諸瘡

附論

夫妊娠之人若肝經有熱播流血脉散於鷄肉榮氣不  
從於肉理則生癰腫諸瘡之類內經謂諸痛痒瘡皆屬  
於心治法宜調經絡平腑臟則邪壅之疾自差

方

分氣湯 治妊娠諸瘡利心經散壅滯

麥門冬 檳榔 當歸 大腹皮 甘草 木通

羌活

芎藭

桑根白皮

剉各一兩

大黃

炒三分

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至六分去滓空心日

午臨臥溫服

薄荷丸 治妊娠氣血壅滯致身體生瘡癢痒

乾薄荷葉

二兩

荊芥穗

一兩半

蔓荊實

去白皮

玄參

甘

草 大黃 人參 麥門冬 去心各一兩 羌活 細辛

去苗各一兩半

右為末煉蜜丸如鷄頭大每服一九茶酒嚼下不拘

時

白芷丸 治妊娠風氣壅頭目不利身體生瘡



白芷

三兩

芎藭

天南星

水煮各一兩

羌活

半兩

菊花

三分 藿

香葉

一兩

防風

半兩

細辛

一兩

當歸

二兩

右搗羅為末酒煮麵糊丸如梧桐子大每服二十九薄荷湯下不拘時候

地黃丸

治妊娠諸瘡

生乾地黃

黃耆

人參

荊芥

梔子仁

黃

苓

甘草

乾薄荷葉

各一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九溫湯下

不拘時

皂莢子散

治妊娠氣壅生瘡

皂莢子

二百枚

槐實

甘草

乾薄荷葉

黃耆

荊芥穗

各一兩

芎藭

天麻

各半兩

右搗羅為散每服一錢匕溫酒調下沸湯亦得不拘

時

荊芥湯

治妊娠血氣壅滯身體生瘡心神不寧

荊芥穗

芎藭

細辛

葳靈仙

甘草

各一兩

皂

莢

半兩不蛀者  
去皮塗酥炙

右粗搗篩每服二錢匕水一盞煎至六分去滓食後  
臨臥溫服之

黃耆湯

治妊娠氣血壅滯生瘡

黃耆

苦參

羌活

獨活

惡實

甘草

炙各  
一兩

右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

秦朮丸

治妊娠瘡疥煩熱瘙瘡

秦朮

半兩

黃耆

枳殼

漏蘆

防風

各一兩半

黃連

去  
鬚

半兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九溫酒空心日午夜臥服

祛風散 治妊娠風熱氣盛致身體生瘡皮膚燥澀大便結滯

羌活 去蘆頭

二兩

大黃

濕紙裹煨二兩

黃耆

剉三兩

芎藭

二兩

朴硝

別研半兩

當歸

切焙一兩半

右搗羅為細散與朴硝勻每服一錢匕日午夜臥用

溫蜜水調下微利為度

治瘡 婦人妊娠患此疾者並治之

黃桑條

去皮剉碎熬灰

蒼耳草

熬灰

右相和冷水濾過又將童子小便一處相和煎用抹在瘡口裏三五日有丁去厭根為妙

治孕癰方立效

用烏藥研出洪州軟白香辣者良水一盞牛皮膠一片同煎至七分溫服

治腦疽瘡 治妊娠婦人患此瘡者

用地石榴草煎酒吃為妙

單胎散 治孕婦痘瘡已發急宜服之以解熱毒不治

傷胎

赤茯苓

去皮

白朮

當歸

中截

白芍藥

赤芍藥

柴

胡乾葛

人參

去蘆

桔梗

去蘆

黃芩

防風

陳皮

去白 荆芥

枳殼

紫草

阿膠

炒

糯米

炒

川白芷

甘草

炙

川芎

縮砂仁

炒

大熱加鬱金

右劉每服三錢水一盞半乾柿蒂七枚野苧根七寸  
甜瓜蒂七枚同銀器煎以小荷葉蓋定去滓蓋盛仍  
用荷葉蓋覆空心服之咎氏方曰金銀能安胎如無  
銀器以瓦器煎入金箔銀箔研入藥內


治妊娠上膈有熱唇口生瘡非時頭痛不安小便黃赤

升麻 杏仁 前胡去毛桔梗 黃芩 麥門冬去心

葛根 知母各等分

右細杵羅為末每服二錢水一盞生姜二片同煎取

八分食後臨臥服





普濟方卷三百四十一

欽定四庫全書

子部  
普濟方卷三百四十二

詳校官太醫院醫士臣針砭

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣楊懋珩

校對官中書臣吳甸華

謄錄監生臣陸維新

欽定四庫全書

普濟方卷三百四十二

明周王朱橚撰

妊娠諸疾門

安胎

附論

夫婦人妊娠常胎動不安者有衝任經虛胞門子戶受胎不實故也并有飲酒房室過度有所損動不安者巢氏云婦人衝任二經挾風寒而有胎故不以日月多寡因誤有擊觸而胎動者有喜怒不常氣宇

不舒傷於心肝觸動血脉衝任經虛乃至胞門不固或因登高上廁風攻陰戶入於子宮如此皆令胎動不安也或妊婦月信不絕而胎不損者何蓋婦人血氣盛衰其人必肥既娠之後乃信常來而胎不動若誤以漏胎治之則胎必墮誠有此也又云婦人經閉不利別有所苦者是謂有子以其經血畜之以養胎擁之為乳汁也有子之後畜養胎矣豈可復能散動邪所以然者蓋有娠而月信復

至是亦未必因血盛也謂婦人榮經有風則經血喜動  
以其風勝則可也既榮經為風所勝則所來者非養胎  
之血以此辨之亦作漏胎治之必宜用保養補胎之藥  
且胎不損強以藥滋之乃所謂實實虛虛也其胎終墮  
宜矣若醫者知榮經有風之理專以一藥治風經信可  
止或不服藥胎亦無恙然而有胎不固或因房室不能  
節先漏而後墮者須作漏胎治之此又不可不審也亦  
有婦人年方壯歲致服補暖之藥而使胞門子戶反為

藥所燥搏使新血不滋舊血不下設或有子不以遲晚則必墮中年之後氣宇漸衰必有崩中帶下之疾或月信愆期漸覺黃瘦腰背不伸五心煩熱五勞七傷之疾從此而生不獨胞門子戶風寒而生也故千金翼方有朴硝盪胞湯正為此疾今之醫者未見有用又論姙娠胎動其由有二一因母病兒胎動但療母疾其胎自安若胎不堅固自動其母疾唯當安胎其母自愈一因勞役氣力或觸冒冷熱或飲食不節或居處失宜輕者轉

動不安重者便致傷墮當以母形色察之母面色赤舌青者兒死母活唇口青兩邊沫出者子母俱死面青舌赤口中沫出者母死子活也 又云孕婦不語非病也間有如此者不須服藥臨產月但服保生丸四物湯之類產下便語得亦自然之理非藥之功也醫家不說與人臨月則與尋常之藥產後能語則以為功豈其功哉按素問黃帝問曰人有重身九月而瘖也為何也岐伯對曰胞之絡脉也帝曰何以言之岐伯曰胞絡者繫於

腎少陰之脉貫腎繫舌本故不能言帝曰治之奈何岐  
伯曰無治也當十月復 又云妊娠將養得所則血氣  
調和故兒在胎則安當產亦易若節適失宜則血氣乖  
理兒在胎則亟動至產育亦難而子上逼於心者由產  
難用氣力胎動氣逆胎上衝逼於心者凡胎上逼於心  
則悶絕胎下乃甦甚者至死也 又曰妊娠之人有宿  
挾痼疾而後有娠或有娠時節適乖理致生疾病並令  
臟腑衰損氣力虛羸令胎不長故須服藥去其疾病並



其氣血以扶養胎也夫妊娠羸瘦或挾疾病臟腑虛損  
氣血枯竭既不能養胎致胎動而不堅固終不能安者  
則可下之免害妊婦也 又云妊娠胎動有因母病以  
動胎有因胎動以病母二者皆不得安也母病則先治  
其母胎自安矣胎病則先治其胎母自安矣間有誤食  
毒物起居不慎氣疾為梗寒熱更作胎漏血下皆致胎  
動又宜隨所因以調護之

方

通靈散

出醫學類證

治妊娠三兩月胎動不安者何男女陰

陽會通血氣調勻乃成其娠設若下血腹痛蓋緣子  
宮久冷血海虛羸致令胎墮其危甚於正產若妊娠  
曾受此苦可預服通靈散養胎

人參 附子

炮

熟地黄

木香

煨

白朮

乾薑

牡丹皮

白芍藥

陳皮

去白

黃耆

蜜炙

薯蕷

甘草

炙 芎藭

右各等分為細末每服二錢水一盞糯米四十九粒

煎八分去米溫服日二服忌一切毒物一方無人參

保生丸

出危氏方

治妊娠將理失宜或勞役胎動不安腰腹

痛重胞阻漏胎惡露時下或子臟挾疾久不成胎或  
受妊不能固養痿燥不長過年不產日月雖滿轉動  
無力或致損墮及臨產節適乖宜驚動太早產時未  
至惡露先下胎胞枯燥致令產難或橫或逆痛極悶  
亂連日不產子死腹中腹上冰冷口唇青黑吐出冰  
冷沫新產惡血上充連悶不省喘促汗出及瘀血未

盡臍腹痛寒熱往來或因產勞損虛羸未復面黃  
體瘦心怔盜汗飲食不進漸成蓐勞八月常服壯氣  
養胎正順產理潤胎易產產後常服滋養血氣和調  
陰陽密腠理實腑臟治風虛除痼冷一切疾

麻仁

去殼  
一兩

當歸

半兩  
微炒

乾薑

炮

肉桂

去  
皮

石斛

去  
根

秦椒

去目閉口  
者炒出汗

石膏

研如  
粉

黃芩

糯米

貝母

甘草

灸  
赤

大豆黃卷

各一  
錢

右為末煉蜜丸彈子大每一丸溫酒棗湯化下空心

嚼下亦可方內用黃芩麻仁性寒之藥人疑不服殊不知娘中有風風中有熱風熱既靜其胎必固黃芩能去子熱麻仁能去子風亦可服參苓白朮散一方

用蒲黃一兩參苓白朮散

方見大方科胃  
腑門胃虛冷類

### 安胎飲

大腹皮

洗

人參

去蘆

陳皮

去白

白芍藥

當歸

中

川芎

炒香附子

炒

縮砂仁

炒

紫蘇

葉

赤茯苓

去皮

甘草

炙

各

等分

右劉燈心七莖糯米半撮同煎服仍以猪肉搗聖功  
散食之仍服神功散解熱毒如治漏胎加阿膠百草  
霜

桑寄生湯 治妊娠胎動不安

桑上寄生

剉

當歸

切焙

赤茯苓

去黑皮

木通

剉

訶梨勒

炮取皮

生乾地黄

焙

陳橘皮

去白炒各一兩

白朮

芎藭

各一兩

兩半

莎草根

去毛炒半兩

木香

錢一

右麤搗篩每服三錢以水二盞入生薑二片同煎至

六分去滓溫服日三

加減安胎飲

出危氏方

凡婦人晝眠不起倦於梳飾乾惡心

擇食怕聞飯氣但醎酸止經候明矣氣血弱者宜服  
此兼進脾藥安胎溫養令母臟氣平和陰陽全備免  
有損墮之患盛者受胎母無疾耳溫胎保養之劑恐  
非所宜此方兼治胎動不安腹痛漏下或胎奔上刺  
心短氣大效漏胎下血不可用辛燥熱藥

條參

去蘆

嫩黃耆

去蘆

湯芍藥

大川芎

粉草

熟

地黃

酒洗切焙

川續斷

去蘆

側柏葉

炒

阿膠

炒

當歸

去尾各等分

右每服四錢水一盞半生薑三片金銀煎之如漏下

不止加熟艾一握如胎動口噤唇青下利不止用熟

艾一两酒三盞煮至二盞去滓灌之即安

桑寄生散

出鴻索方

治妊娠胎動不安下血不止胎漏經血

妄行者何荅曰妊娠成形胎息未實或因房室驚觸

勞力過度從高墜下重物所壓傷動胞胎或食毒物

致令子宮虛滑經血淋瀝若不急治敗血湊心子母



難保日漸胎乾危亡不久

桑寄生

當歸

去蘆酒浸

川續斷

酒浸

芎藭

香附子

炒去

毛

阿膠

剉蛤粉炒成珠

茯神

去木

白朮

已上各一兩

人參

甘草

炙各半兩

右以咀每服四錢水一盞半薑五片煎至七分去滓

溫服不拘時候

旋覆花湯

出千金方

治妊娠六七月胎不安常服之

旋覆花

兩

半夏

芍藥

生薑

各二兩

枳實

厚朴

去皮白朮

黃芩

茯苓

各三兩

右咬咀以水一斗煮取二升半分五服日三夜二先  
食服忌羊肉錫醋桃李雀肉

厚朴橘皮丸 治胎動不安心腹痛

厚朴

去麤皮生薑汁炙一兩

陳橘皮

湯去白焙一兩

木香

一兩白朮一兩

半

阿膠

炙燥半兩

當歸

剉乾薑炮

訶梨勒皮

各半兩

吳茱

萸

洗焙乾炒一錢

右搗羅為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九食前  
米飲下

安胎飲 治妊娠胎氣不安腹痛煩悶

芎藭

阿膠

炙燥

艾葉

當歸

切焙

人參

甘草

炙

白

茯苓

去黑皮

黃耆

剉

麥門冬

去心焙

各一兩

右麤搗篩每服五錢以水一盞半煎八分去滓空心

溫服不拘時候

紫蘇飲 治妊娠胎氣不和懷胎近上脹滿疼痛謂之

子懸兼治臨產驚恐氣結連日不下

出簡易方

當歸

三錢

甘草

一錢

大腹皮

製

人參

川芎

陳橘皮

去白芍藥

各半兩

紫蘇一兩

右咬咀每服半兩水一盞半薑四片葱白七寸煎至七分去滓空心溫服一方加木香一方無川芎名七寶散昔日曾有一婦人累日產不下服遍催生藥不驗予曰此必坐草心懷恐慮氣結而然非順不順也素問云恐則氣下蓋則精却却則上氣閉閉則氣還還則下焦氣乃不行矣得此藥服便產及婦人六七月子懸者予用此藥數數有驗不十服胎便近下注

云恐則陽精却上而不下流故却則上焦閉也上焦  
既閉氣不行流下焦陰氣亦還迴不散而聚為脹也  
然上焦固禁下焦氣各守一處故氣不行也 方出  
本事丁未六月間羅新恩孺人黃氏有孕七箇月遠  
去而歸忽然胎上衝心而痛坐卧不安兩醫治之無  
效遂說胎已死矣已用葶麻子皮研爛加麝香調貼  
臍中以下之命在垂危召僕診視兩尺脉沉絕他脉  
平和僕問二醫者曰契兄作何證治之荅曰死胎也

何以知之荅曰兩尺脉絕以此知之僕問之曰此說出在何經二醫無荅遂問僕曰閣下作何證治之荅曰此子懸也若是胎死却有辨處面赤舌青者子死母活面青舌赤吐沫者母死子活唇舌俱青者母子俱死是其驗也今面色不赤舌色不青其子未死其證不安衝心而痛是胎上逼心謂之子懸宜紫蘇飲子治藥十服而胎近下矣若兩足腫滿及身腫不必治產後自平亦有產後腫不退煮萊豆汁并豆任意

食之自退

安胎飲

出仁存方

治胎動不安非時轉動無故下血腰腹疼

痛四肢沉重懈怠不欲執作及妊娠一切疾病並治之蓋安胎之法必須以藥順氣和胃自然無害

川芎 當歸 熟地黃 砂仁 陳皮 白芍藥

炒 白茯苓

阿膠

各一兩

右咬咀每服四錢水一盞半葱白一根煎至七分去滓溫服不拘時候

阿膠散

出聖惠方

治妊娠胎動不安心神虛煩腹內疼痛

阿膠

一兩搗碎炒令黃燥

白茯苓

麥門冬

去心紫胡三錢

甘草

炙微赤剉

黃芩

當歸

剉微炒各半兩

芎藭

一兩

右搗篩為散每服四錢以水一鍾入生薑半分棗三

枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

芎藭飲子

出聖惠方

治胎動不安心神虛煩

芎藭

三錢艾葉半兩

微炒

阿膠

三錢搗碎炒令黃燥

糯米

半合熟地黄

一棗

五枚

青淡竹茹

生薑

各半兩



右細剉和勻以水二大盞煎至一盞五分去滓不計

時候分溫三服

如聖湯

出濟生方

治胎動腹痛胎動腹痛者何荅曰胎動腹

痛其理不一蓋緣飲食冷熱動風毒物或因再交搖動骨節傷犯胞胎其後多嘔氣不調和或服熱藥太過氣血相干急服順氣藥安胎不然變成漏胎則難安矣

鯉魚皮

當歸

去蘆酒浸

熟地黃

酒蒸

白芍藥

川芎

阿膠

劉蛤粉炒  
成珠子

川續斷

酒浸

甘草

炙各  
等分

右以咀每服四錢水一盞半入苧根少許生薑五片

煎至七分去滓溫服空心食前

縮砂湯

出直  
指方

治胎動腹脇腰痛或忍痛失氣胎又不動

或血水間下

縮砂

桑寄生

各半  
兩

當歸

川芎

艾葉

炒

阿膠

酥炒各

三錢

南木香

甘草

炙各  
二錢

右剉散每服三錢薑五片棗二枚煎服下水者更

以真料理中湯加縮砂佐之

續斷湯 治妊娠胎動腹痛腰痛

續斷 當歸焙 芎藭 桑上寄生剉各兩 糯米一兩

阿膠炒 艾葉炒 竹茹各半兩

右咬咀每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候

大安散 治妊娠胎動腹痛

懷香子三兩

白茯苓去黑皮一兩

阿膠炒燥半兩

芎藭 當歸

桑上寄生

剉

甘草

炙

陳橘皮

湯浸去白  
焙各三錢

右為細散每服二錢溫酒調下食前服

如聖散

出醫學  
類證

治證同前如聖湯

鯉魚皮

阿膠

炒

芎藭

當歸

去頭  
尾

青竹茹

生薑

乾地黄

各二  
錢

右㕮咀用水二盞煎至一盞去滓溫服一方有乾薑

白朮散

出十便  
良方

治妊娠腹中冷胎動不安

白朮

三錢

草薢

去皮

當歸

剉微炒  
各一兩

甘草

炙微  
赤剉

乾薑

炮裂  
剉

芎藭

各半兩

厚朴

一兩去麋皮生薑汁炙令香熟

右搗篩為散每服三錢以水一中盞入棗三枚煎至

六分去滓每於食前溫服

阿膠散

出大全良方

治妊娠不問月數深淺或因毒藥胎動

不安腰痛腹滿或有所下或胎上搶心短氣

熟地黄

二兩

白芍藥

艾葉

當歸

甘草

阿膠

黃耆

各一兩

右咬咀每服半兩水一大盞薑三片棗一枚煎至七

分去滓溫服無時一方有川芎無芍藥

白朮丸

出大金良方

調補衝任扶養胎氣治妊娠宿有風冷

胎痿不長或失於將理傷胎氣多治損墮妊娠常服

益血保胎

白朮 川芎

阿膠

炒

地黃

炒令焦六錢

當歸

去尾炒各一兩

牡蠣

煨為粉二錢

川椒

三錢如常製

右為末煉蜜為丸如梧子大空心米飲吞三四十丸

酒醋湯亦可

阿膠散

出聖惠方

治妊娠胎動腹中疼痛不思飲食

白茯苓

白朮

川芎

阿膠

妙各三錢

當歸

炒

陳皮

各一兩

甘草

一錢

右咬咀每服三錢水一盞薑三片棗一枚煎至七分去滓溫服之

順氣飲子

出永類鈴方

治安胎

紫蘇葉

木香

炮

人參

草薢

茯苓

各一兩

生

甘草

五錢

大腹子

一兩如氣弱者不用

右吹咀每服三錢水一盞芩根三寸糯米少許煎至七分去滓溫服單用川芎葱白煮服佳

保氣散

出危氏方

安胎寬氣進食瘦胎易產設或居處失宜

偶然頓仆胎痛漏胎下血兼服芎歸湯枳殼散

大腹皮

紫蘇

枳殼

去穢

桔梗

去蘆

粉草

縮砂

香附子

各等分

右剉散每服三錢水一盞半煎食前服

保氣散

出永類鈴方

安胎寬氣進食瘦胎易產設或居處失



宜偶然頓仆胎動胎痛漏胎下血煎服佛手散神寤  
九枳殼散此三藥入月內大宜常服甚良

香附子

四兩

山藥

二兩

縮砂仁

一兩

木香

四錢

粉草

一兩

益

智仁

紫蘇葉

各半

右為細末白湯點二錢服

療妊娠重下痛引腰背安胎止痛

出大全良方

當歸

膠炙

乾地黄

黃連

芍藥

各一兩

雞子

一枚

秫米

一升

右咬咀以水七升攪雞子令相得煮秫米令如蠟目沸去滓內諸藥煮取三升分四服忌蕪荑

膠艾湯

一名當歸散  
出千金方

治妊娠二三月上至七八月其人

頓仆失踞胎動不安傷損腰腹痛欲死若有所見及胎奔上搶心短氣下血不止

艾葉

三兩 阿膠

芎藭 芍藥

甘草

當歸

各二兩

乾地黄

四兩

右咬咀以水五升好酒三升合煮取三升去滓內膠

更上火令盡消分三服日三不瘥更作一方有黃耆  
一方治卒下血胎動不止用水煎服一方胃中冷加  
薑棗煎一方用乾薑

麥門冬飲 治妊娠五六月胎動不安寒熱往來身體  
驚戰卒有所下腹痛如欲產

麥門冬

焙去心

人參

甘草

炙

阿膠

炙

黃芩

去黑心

熟

乾地黄

焙

烏梅

去核炒

各一兩

右麤搗篩每服五錢以水一盞半生薑三片棗二枚

擘破煎至八分去滓不拘時溫服

救生散

出危氏方

安胎益氣易產令子緊小令母無病亦治

胎氣本弱不宜瘦胎服此安胎順氣易產

人參

訶子

煨去核

麥蘖

炒

白朮

神麴

橘紅

工炒各等分

右剉散每服三錢水一盞半煎空心服

釣藤湯

出大金良方

治妊娠八九月胎動不安心腹疼痛面

目青冷汗出氣欲絕此由勞動用力傷胎宮急治之

釣藤

當歸

酒浸

茯神

去木

人參

各一兩

苦梗

酒洗

一兩半

桑寄生

半兩

右為粗末每服五大錢水二盞煎至一盞去滓溫服  
無時候一方加葱白生薑同煎忌豬肉菰菜若煩熱  
加石膏二兩半臨產月加桂心一兩

當歸飲子

出大全良方

治妊娠無故胎動不安腹內絞痛煩悶

當歸

桑寄生

各四錢

川芎

三錢

阿膠

二錢

葱針

四寸

右以水二升煎取八合下膠空腹溫分二服一方無  
豉用銀器煎一方無寄生豉有續斷三錢銀多少先

煎後入藥

乾地黄散

出聖惠方

治妊娠胎動心神煩悶腹痛不止

熟乾地黄

一兩半

乾薑

半兩炮梨剉

當歸

一兩剉散炒

人參

去蘆頭

阿膠

搗碎炒令黃燥各三錢

甘草

一錢炙微赤剉

右搗篩為散每服三錢以水一中盞入棗三枚煎至

六分去滓不計時候稍熱服一方無乾薑

療妊娠患腹痛并胎動不安

出大全良方

葱白

切一人

參

厚朴

阿膠

川芎

各二兩剉炒

當歸

三兩

右咬咀以水七升煎取三升分作三服日用一劑其  
病自安功不盡述

安胎當歸飲

一名人參散  
出大金良方

治妊娠五月舉動驚愕胎動

不安下在小腹痛引腰絡小便痛下血

當歸

阿膠

芎藭

人參

各一兩

棗

十二箇

艾

一虎口

右細切以酒水各三升煮至三升去滓內膠令烱分  
三服腹中當安小便緩也一方有甘草無參棗治妊  
娠二三月至八九月胎動不安腰痛止用水煎

生芩根散

出聖惠方

治妊娠胎動腹內疼痛心神煩熱飲食少

生芩根

剉

阿膠

搗碎炒令黃燥各一兩半

黃芩

赤芍藥

各三錢

當歸

一兩剉微炒

右搗篩為散每服四錢以水一中盞入棗三枚同煎

至六分去滓不計時候稍熱服

麥門冬散

出聖惠方

治妊娠胎動腹中疴痛坐卧煩悶

麥門冬

去心

芎藭

陳橘皮

湯浸去白瓤焙炙一兩

白茯苓

當歸

剉微炒各一兩



右搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半錢棗

三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

葱白湯

一名續斷葱白湯出千金方

治妊娠胎動不安腹痛

葱白

切一升

阿膠

二兩

當歸

續斷

芎藭

各三兩

右㕮咀以水一斗先煮銀六七兩取七升去銀內藥

煎取二升半膠令烱分三服不瘥重作

當歸飲

出聖惠方

治妊娠胎動盪心悶絕煩躁口乾橫生倒

產上衝下築迷悶唇口青黑手足厥冷產科名保安

散

當歸

人參

各一兩半

阿膠

炒一兩

甘草

二兩葱白

連根一握

右細剉水二升煎四味至升半去滓下葱白再煎三合溫服一劑分為二三服一方有川芎名芎歸葱白湯無甘草

竹茹散

出聖惠方

治妊娠胎動不安手足煩疼

甜竹茹

當歸

剉微炒

芎藭

黃芩

各一兩

甘草

半兩炙微赤剉

右細剉和勻每服半兩以水一大盞煎至七分去滓

食前分溫二服

療安胎胎病漏血腹痛

出大金良方

當歸

川芎

阿膠

炙

人參

各一兩

大棗

二十枝

右切以水三升酒四升煮取二升半分三服五日一劑頻服三四劑百無所忌

鯉魚粥

出大金良方

治妊娠胎動不安

方見前治妊娠諸疾類

地黃湯

一名膠艾湯出聖惠方

療妊娠二三月上至七八月頓仆

失踞胎動不安傷損腰腹痛欲死若有所見及卒驚

奔走或從高墜下搶心短氣下血不止

乾地黄

當歸

艾葉

各二兩

阿膠

川芎

各三兩

右以水七升煮取二升半分作三服或為末酒調亦得腹痛甚加杜仲五加皮各三兩一方治卒然下血不止無地黄有甘草一方無地黄却用生薑自然汁一匙地黄汁半合馬通半合煎成藥去滓入此再煎三沸溫服一方有人參白茯苓水煎

艾葉飲

治妊娠冷熱腹內不調致胎不安

方見漏胎類

寄生湯

出大全良方

治胎氣不安及五月已後胎不安者

桑寄生

洗對

秦艽

阿膠

各半兩

糯米

半兩作粉

右以新汲水三升先下寄生秦艽二味煮至二升去滓次入阿膠糯米再煮約有一升止分作三服空心食前日午服之忌酒醋三五日娘婦胎氣五月已後常不安者服之必效頓見娘婦好飲酒食醃酸五辛胎必動為驗

安胎寄生湯

出肘後方

療流下血

桑上寄生

白朮

錢各五

茯苓

錢四

甘草

錢一

右㕮咀以水五升煮取二升半分三服若人壯者可加芍藥八錢足水二升若胎不安腹痛端然有所見加乾薑四錢即安忌海藻菰菜醋物桃李雀肉等一方無白朮

安胎湯 治婦人胞胎不安

槐花

炒香熟

貝母

去心焙

當歸

剉焙

芎藭

右各等分粗搗篩每服三錢以酒水各半盞童子小

便二合同煎至七分去滓溫服

當歸飲

一名寄生葱豉湯出聖惠方

治妊娠胎動煩熱滿悶安胎亦

治腹痛悶亂

當歸

切焙

桑寄生

各半兩

芎藭

一錢半

阿膠

炒燥三錢

右麤搗篩每服五錢以水一盞半入葱白三寸切豉

三十粒同煎至八分去滓食前溫服

一名桑寄生散

安胎飲

出三方因方

治妊娠寒腹痛或胎熱多驚舉動腰痛腹

滿胞急卒有所下或頓仆悶飲食毒物或感時疾寒

熱往來致傷胎臟下血

川芎

枳殼

切麩炒去穰各兩半

熟地黄

三兩

糯米

二合

右為劉散每服四大錢水一盞半薑五片棗一枚金

銀少許同煎至七分食前服

秦朮散

出聖惠方

治妊娠胎動煩熱不安

秦朮

去苗

甘草

炙微赤剉

鹿角膠

搗碎炒令黃燥各半兩

右搗篩為散每服三錢以水一大盞入糯米五十粒

煮米熟為度去滓不計時候溫服



鯉魚臙方

出聖惠方

治妊娠胎動不安心腹刺痛

鯉魚

一個修淨切

阿膠

一兩搗碎炒令黃燥

糯米

二合

右以水二升入魚膠米煮令熟入葱白生薑橘皮鹽各少許更煮五七沸食前喫如有所傷喫五七日效

又方阿膠散

出聖惠方

桑寄生

一兩半

艾葉

半兩微炒

阿膠

一兩搗碎炒令黃燥

右咬咀以水一大盞半煎至一盞去滓食前分溫三

服每服四錢

二香散 療妊娠胎氣不安氣不升降飲食不美嘔吐  
酸水起坐覺重宜服之

香附子

藿香葉

甘草

各二錢

右為細末每服二錢入鹽少許百沸湯點下

葱豉散

出聖惠方

療婦人懷妊胎動不安令胎安穩

香豉

用一升熬

葱白

一升

阿膠

二兩炙

右先以水三升煮葱豉取一升去滓入膠再煎令烱  
服一日一夜可服三四劑

黃耆湯

出大金  
良方

治胎動不安腹痛下黃汁

糯米

一合

黃耆

川芎

各一  
兩

右細剉水二大盞煎至一盞三分溫服

治胎動漏胎

出大金  
良方

熟艾

阿膠

各二  
兩

葱白

一升

右以水四升煮取一升半分為三服

銀芩酒

出大金  
良方

治妊娠胎動欲墮腹痛不可忍

芩根

三兩  
剉

銀

五兩

清酒

一盞

右以水一大椀煎至一大盞去滓分溫二服

秦朮湯

出指南方

治胎動不安

秦朮

阿膠

炒艾葉各等分

右為麤末每服五錢水二盞糯米百粒煎至一盞去

滓溫服之良

阿膠湯 治妊娠胎動不安腰腹疼痛止痛安胎

阿膠

炒燥

當歸

剉碎

桑上寄生

剉碎各半兩

右麤擣節為散每服三錢以水一盞煎至六分去滓

空心溫服之

大腹湯 治妊娠胎動不安腰腹疼痛

連皮大腹

劉徽炒  
二兩

草豆蔻

去皮煨  
一兩

陳橘皮

浸去白  
炙一兩

右麝香每服三錢以水一盞煎至七分去滓溫服  
不拘時候

安胎鐵罩散

白藥子

一兩半  
白芷  
兩

右為細末每服二錢紫蘇湯調下或胎熱心煩悶入

砂糖少許煎

療妊娠後胎不轉動

阿膠

炙一兩

桑寄生

兩

右為末以酒一升煮五沸下生雞卵一枚投酒中分  
溫二服空心食前一服一方無寄生有艾葉只用水煎  
內補丸 安胎扶虛助陰滋血妊婦衝任脉虛補血安

胎

一名地黃  
當歸湯

熟地黃

二兩洗  
酒作炒

大當歸

一兩去尾  
切片微炒

右為末煉蜜丸如梧子大每服三十五丸溫酒下與枳殼散兼服若單服枳殼散恐有胎寒腹痛之疾二藥皆不群隊為妙仍用平胃散蘇鹽湯調助脾進食一方治婦人有孕胎痛不安為散水煎頓服之

治胎動不安

一名川芎  
蔥白湯

川芎

二蔥白一升

右以水七升煮取二升半分溫三服

芎藭湯

治婦人妊娠五七月因事築碯着胎或子死

腹中惡露下疼痛不已口噤欲絕用此藥探之若不損則痛止子母俱安若胎損立便逐下兼治血上衝心腹滿悶者及產前產後體熱敗血腹痛

一名佛手散

當歸

六兩  
川芎四兩

右為麤末每服三錢水一大盞煎令泣泣欲乾投酒一大盞止煎一沸去滓溫服口噤灌之如人行五里再服不過三二服便生一方云此藥治傷胎去血多崩中去血多金瘡去血多拔牙去血多昏暈欲倒者



以水煎服。妊娠臨月，可兼滑胎枳殼散服之，縮胎易產，斷無疑難。產後血暈，加白芍藥等分煎服。名芍藥芎藭湯。產後腹痛不可忍，加官桂等分，酒與小便合煎。名桂香飲。婦人室女心腹疴痛，經脈不調，加水煎。名君臣散。

療妊娠腹內冷痛，忽胎動不安。

薤白一升 當歸兩

切四兩

右以水五升煮取二升，作三服。亦將小便服，將去一

炊頃出一方無薤白有葱白

黃芩湯 治婦人孕胎不安

白朮 黃芩

右等分為末每服三二錢水二盞入當歸一根同煎至一盞溫服一方加縮砂

杜仲丸 治妊娠三兩月胎動不安妊娠三兩月胎動不安者何荅曰男女陰陽會通氣血調勻乃成其孕設若下血腹痛蓋由子宮久虛致令胎墮其危甚於

正產若妊娠曾受此苦可預服杜仲丸以養胎

杜仲

去皮剉薑汁浸炒去絲

川續斷

酒浸各一兩

右為細末棗肉煮爛杵和為丸如梧桐子大每服七十丸空心米飲下日三服

二珍散

治胎不穩坐卧不安

一名川芎散

木賊

去節川芎等分

右為末每服三錢用水一盞入金銀各少許同煎七分去滓空心服

獨聖散 治妊娠時氣身大熱令子不落護胎及治妊

娠從高墜下觸動胎氣腹痛下血無治崩血甚效名一

小安  
胎飲

用和殼縮砂三兩以熨斗盛炒去殼為末如胎動  
熱酒調下不飲酒煎艾鹽湯調服米飲亦可須臾  
胎熱則安矣仍用單胎散調服仍間服安胎飲尤  
妙一方去膜炒依前法調服

安胎方

用豉汁服之妙

治妊娠

用五月五日採莧菜和馬齒莧為末等分調服之

易產

卒腹痛安胎

出肘後方

用烏雞肝一具切過酒五合服令盡又云肝勿令

入水中妙

白散子

治妊娠護胎

方見本門前傷胎寒類護胎白散子

安胎方

用竹瀝服之

治兒在腹中哭

出危氏方

用多年空屋下鼠穴中土一硯令產母嚙之即止

又方

用川黃連濃煎汁母呷之

治胎動不安心神煩熱及治腰痛或搶心痛或漏血不

止

出聖惠方

用茅根五兩以水二大盞煎至一盞去滓不計時  
候分溫三服之

治妊娠胎動煩悶不安甚者方

出聖  
惠方

用生地黃搗絞取汁每服一小盞煎令沸入雞子  
白一枚攪令勻頓服之

治妊娠胎動晝夜叫呼口噤唇蹇及下重痢不息

出傳

信適  
用方

用艾葉咬咀以好酒五升煮取四升去滓更煎一

升服口閉者格口灌之藥即下瘥亦治妊娠腰痛  
及妊娠熱病一方治胎動上迫心痛用頭醋煎服  
亦治妊娠卒下血一方用如雞子大大頭四升煎  
二升溫分三服

治胎動不安

出大全良方

用好銀煮取水着葱白作羹食之佳

葱白飲

出聖惠方

治胎上逼心煩悶及妊娠六七月已後胎

動困篤



用葱白二七莖濃煮汁飲之即安若胎已死服之即出未死即安未效再服亦療胎動腰痛搶心或

下血

治胎不順胎上逼心

出大全良方

用烏犬血少少飲之當下

療妊娠卒胎上迫心痛

出大全良方

用弩弦急帶之立愈

竹茹湯

出聖惠方

療妊娠煩躁或胎不安或口乾

用淡青竹茹一兩以水一大升煮取四合徐徐服  
盡為度一方治胎動安胎以甜竹根煮濃汁飲之  
治安胎胎動懷妊身腫

用煮鯉魚肉為湯食之一方以絹裹和鱗煮羹熟  
後去鱗食驗

妊娘子上衝心

飲葡萄湯即下其胎安一方用葡萄根濃煮汁飲  
之

治胎動不安

出肘後方

用芎根如足大指者一尺咬咀以水五升煮取三

升去滓服之瘥

杜仲丸

出肘後方

治婦人胞胎不安并產後諸疾

用杜仲不計多少去麋皮細剉瓦上燂乾搗羅為末煮棗肉和丸如彈子大每服一九爛嚼以糯米湯下

附子黑神散

溫暖胎孕則自出矣孕婦去血既多者

用雞肉櫛聖功散多用雞羹補之

治孕婦腹內鐘鳴

用鼠窟前後土為細末麝香酒調下二錢其產立愈

知母丸

一名萬應丸

治日月未足而痛如欲產者兼治產難

及子煩

用知母為細末煉蜜丸如雞頭大溫酒嚙下日三

服或用粥飲湯下亦可一方如梧桐子不拘時候

每服二十九

治姙娠胎動腹痛

出大金良方

用蒲黃如棗核大篩過以井水調下

又方

出大金良方

用梁上塵竈突煤為細末空心酒服方寸匕

治姙娠忽被驚惱胎向下不安小腹連痛頻頻下血忽

因房室有所觸動致令如此宜服此方若喫藥了下

血不止更請好好精詳審定別下藥恐胎損血下盡

即傷損母性命也

出護命方

人參 阿膠炙 白朮 艾葉炙 茯苓 桑寄生

當歸 乾地黄各一錢

右細杵羅為末每服五錢水一盞大棗三枚同煎三

五沸空心喫

治妊娠四五月忽七八月胎動不安出護命方

桑寄生 當歸 芎藭 艾葉炙 人參各等分

右細杵羅為末每服三錢水一盞五分葱白五枝同

煎取一盞空心和滓喫

治妊娠經得三四月忽五六月非時下血并氣痛不安

未知是胎不是胎若是胎喫此藥方即安若不是胎

喫此方即行下惡血便安樂也

出護命方

當歸

桑寄生

各半兩

芍藥

川芎

各一錢

細辛

三銖去葉

右為細末每服三錢水一盞五分煎取一盞空心去

滓服

白朮散

出永類鈴方

治胎氣不和飲食不進

方見木門前妊娠類

育胎飲子

出朱氏集驗方

治妊娠胎動不安或腰腹疼痛

覆盆子

阿膠

蛤粉炒  
各三錢

桑寄生

艾葉

炒

白芍藥

當歸

人參

各二錢

右咬咀每服四錢水一盞半糯米百粒煎八分去滓

食前服

鐵罩散

出華佗  
中藏經

治安胎如神

以香附子炒去毛令淨細末濃煎紫蘇湯調下一

錢一方有縮砂炒焦去殼白湯點服如胎動出血

阿膠艾湯調服



熟乾地黄丸

出十便良方

治婦人血臟虛冷妊娠時復漏下

宜服溫暖血臟安養胎氣

熟地黄

白芍藥

川芎

當歸

艾葉

阿膠

乾薑

白朮

各一兩

甘草

半兩

右搗羅為細末煉蜜和丸如桐子大曝乾每服三十

丸米飲空心服

紫蘇飲

出便產須知

治子懸妊六七月懷胎近上腹痛

紫蘇葉

一大腹皮

炙

川芎

當歸

各三錢去蘆

粉草

一錢

人參

右分三服水盞半薑四片葱七寸煎七分去滓空心服

安胎方

出肘後方

治胎動不安

甘草

一尺

阿膠

灸四兩

雞子

二枚

右以水二升煮取一升頓服之

妊娠二三月至八九月胎動不安已有所見

出永類鈴方

艾葉

阿膠

灸

當歸

各三兩

甘草

一兩半灸

右以水八升煮取三升去滓內膠更上火膠消分三

服日三一方有川芎三兩

地黃當歸湯

出醫方大方

治婦人有孕胎痛

當歸

一兩熟地黃二兩

右為末作一服水三升煎一升去滓頓服

阿膠散

出保嬰方

治妊娠不問月數淺深或因倒仆所損致

令胎動不安或胎氣奔上心腹疼痛或胎下墜腰膝疼痛或時下血並宜服之

熟地黃

洗焙乾

白芍藥 川芎

黃耆

去皮

阿膠

剉炒成珠

香附子

炒

當歸

去蘆酒洗焙乾

艾葉

炒

甘草

炙已上各半兩

右件九味為咀咀每服九錢以水二大盞入生薑九片棗子三枚同煎一大盞去滓空心食前熱服日服

立安

藿香散

安胎和氣利胃腸治噎塞阻食

藿香

人參

茯苓

去皮

白芷

甘草

微炙

威靈仙

桔梗

右七味各等分為末每服二錢水一盞薑三片煎六

分食前溫服之

人參養血丸

出說  
說方

治婦人諸虛不足安胎順氣去子宮

風冷有娠應是婦人虛弱之証並皆治之

人參 白茯苓 白朮 川芎 白薇 藁本頭

粉草 厚朴 川白芷 牡丹皮 炮薑 玄胡

索 沒藥

別研

北石脂

醋淬  
七次

木香

不見  
火

南芍藥

各一  
兩

當歸

一兩半  
酒浸

大艾

四錢重  
燒灰

右為末煉蜜丸如彈子大每服一兩作四丸常服溫

酒嚼下婦人不受孕濃煎北棗湯下婦人常服有孕  
能保產氣入月每日服兩丸臨產小腹無痛催生黃  
蜀葵子煎湯送下產後血暈生地黃湯送下產後常  
服則血氣壯健疾少

十月厥陰行令地氣不收冬氣不藏萬物反生濛霧以  
行人病關閉不禁心痛陽氣不收氣嗽孕婦多暴死  
忽墜胎之病宜服暖肝藥以治之治動胎不安方無  
問太歲但寅申年十月頻有濛霧淒清之化孕婦有

胎動不安之病宜進此藥

出大全良方

人參 防風 當歸 五味子 白朮 續斷

各二兩

川芎

半兩

桑寄生

三錢

甘草

二錢

細辛

一錢

右為細末每服一錢半八分水一盞煎取七分空心

去滓服

阿膠散

出衛生家寶方

治胎動不安

以阿膠搗碎炒令燥甘草炙各半兩當歸三錢洗切焙芎藭一兩為細末每服三錢水一大盞煎七

分去滓溫服空心食前

芎藭丸

出楊氏家藏方

安胎補衝任止胎漏調血脉及療子臟

風冷腰腹疼痛或久無子息或妊娠損墜

乾薑

炮

附子

炮去皮臍

山茱萸

續斷

川芎

白芍

藥

蒲黃

各一兩

生地黄

三錢

白朮

兔絲子

酒浸軟另研

肉從蓉

酒浸一宿切焙

黃耆

各二兩

右為細末蜜糊為丸如桐子大每服三十九煎木香

熟米飲空心下



六物湯

出楊氏家藏方

安胎和氣治胎動不安腰腿疼痛惡露

頻下

阿膠

蛤粉炒成珠子

糯米

炒

黃耆

蜜炙

川芎

當歸

洗切焙

熟地黄

洗焙六味各等分

右咀咀每服三錢水一盞薑三片葱白一寸煎七分

去滓空心服

主安胎下氣殺鬼精

出本草

以鹿骨膠浸酒服

治胎動下血胎不落

出本草

以生地黄搗汁飲之

安胎方

出本草

以荷葉蒂水煮服之

治姙娠胎動上迫心痛如折

出本草

以生麴半餅搗碎水和絞取汁服三升

安胎

用蔥葉作羹粥及作齋食之良

胎驚

附論

夫胎處腹內隨母聽聞纔覺受氣便宜將順若妊娠月滿或欲逼生形體完具精神已成母忽驚動遂為驚胎則轉移不常宜速治之不爾則精氣併居令子發癲

又云妊娠者心神忪悸睡裏多驚兩脇膨脹腹滿連臍急痛坐臥不寧氣急逼迫胎驚者何荅曰胎氣既成五臟安養皆因氣或為喧呼心忪悸亂致令胎驚筋骨傷痛四肢不安急煎大聖散安保胎孕則無危矣 又云

妊娠驚胎者是懷妊月將滿或將產其胎神識已具外有勞傷損動而胎在內驚動也

方

阿膠湯 治妊娠驚胎轉動不定

阿膠

炒燥

桑寄生

剉焙

大腹皮

剉

黃耆

剉

麥門冬

去心焙

防風

去叉

丹參

羚羊角屑

栢子仁

微炒

縮砂仁

各半

兩人參

白朮

各一兩

右粗搗篩每服三錢以水一盞煎至七分去滓溫服

茯苓散

出聖惠方

治妊娠因用力執作覺胎動心腹急痛面

青汗出頭仰氣喘欲絕服諸藥安胎無效又名驚胎

白茯苓

桔梗

去蘆頭

生地黃

人參

去蘆頭

桂心

當歸

劉微炒

釣藤

獨活

桑寄生

赤芍藥

劉微赤劉

石膏

各一兩

右為細末散每服四錢水一盞煎六分去滓不拘時

溫服

定神丸

一名陟釐丸出聖惠方

治妊娠驚胎并胎動腹痛下血

陟釐 生地黃

焙一作熟  
乾地黃

人參

當歸

炙令香  
剉碎

龍骨 赤石脂

厚朴

去粗皮生  
薑汁炙剉

禹餘糧

醋淬三  
五遍

赤芍藥

剉炒

吳茱萸

炒各  
一兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服二十九空心熱水或

粥飲下

人參湯 治妊娠因驚胎內轉動

人參

柴胡

去苗

桑寄生

甘竹茹

青橘皮

湯去白  
浸焙

續斷

芎藭

各一兩

艾葉

焙乾  
半兩

右粗搗篩每服三錢以水一盞入棗三枚擘破同煎至七分半去滓溫服

當歸湯 治妊娠因驚胎動不安

當歸

炙香劉

生地黄

焙

艾葉

炒

甘草

炙各一兩

芎藭

炒三錢

芍藥

劉碎

阿膠

炙令燥各三錢

人參

二兩

右麤搗篩每服三錢以水一盞煎至七分食前去滓

溫服

大聖散

出產經

治妊娠心神忪悸睡裏多驚兩脇膨脹腹

滿透臍急痛坐卧不寧氣急迫逼胎驚

白茯苓

去皮

川芎

麥冬

去心

黃耆

去蘆蜜炙

當歸

去蘆酒浸

各一兩

木香

不見火

人參

甘草

炙各半兩

右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎七分去滓服

不拘時常服至分娩亦無恙安養胎氣忌生冷

黃芩湯

治妊娠不安驚胎胎動時時轉易

黃芩

去黑心

白朮

剉炒

白芍藥

剉炒各半兩

黃耆

剉人參

山芋

各一兩



右粗搗篩每服五錢以水一盞糯米半合葱白三寸  
細切煎至八分去滓溫服食前

茯神散 治妊娠胎不穩鎮心安胎

茯神

去木

芍藥

剉炒

桑白皮

剉炒

當歸

切焙

芫薺

各一兩

人參

二兩

右為散每服三錢以米飲調服不拘時

桑寄生散

出聖惠方

治妊娠端然有所見驚胎流下不安若

跳動心中痛不安

桑寄生

芫薺

白朮

當歸

微炒

剉各一兩

白茯苓

三錢

甘草

半兩炙  
微赤剉

右為散每服三錢以水一中盞入生薑五分煎六分

棗三枚不拘時服

熟地黄散

出聖惠方

治妊娠數月已來舉動驚胎小腹疼痛

不可忍

熟地黄

阿膠

搗碎炒  
令黃燥

艾葉

微炒

芎藭

杜仲

去粗皮炙

剉黃

當歸

剉微炒  
各一兩

右為散每服四錢水一中盞入棗三枚煎至六分去

滓不拘時服

當歸散

出聖惠方

治妊娠被驚胎動向下不安小腹連腰痛

當歸

劉微灸

芎藭

阿膠

搗碎炒令黃燥

人參

去蘆頭

白茯苓

各一兩

艾葉

半兩微炒

右為散每服四錢水一中盞煎六分去滓不拘時服

芎麻散

治妊娠驚胎

芎麻根

一握剉

訶梨勒

煨去核

茯神

去木各一兩

山芋

切一兩

人參

二兩

右為散每服二錢以米飲調下不拘時

艾葉湯 治姙娠外因驚動胎內不安轉移不寧

艾葉

炙乾三錢

桑寄生

剉炒一兩半

人參

二兩

茯神

去木三錢

阿膠

炙令燥三錢

右粗搗篩每服三錢以水一盞入糯米半合葱白三寸并鬚切同煎至七分去滓溫服食前

芎藭湯 治姙娠外有驚動令胎內不穩

芎藭

二人參

三兩

當歸

切焙一兩

甘草

炙半兩

阿膠

炙令燥半兩

右粗搗篩每服三錢以水一盞葱白二寸拍碎同煎至七分去滓溫服食前

生銀湯

出聖惠方

治妊娠驚胎不安心神煩悶

生銀

五兩葱白

三寸切

阿膠

半兩炒

右以水一盞同煎至七分去銀并滓溫服若要作粥服入糯米二合煮為粥服之甚佳

腹胎飲子

出朱氏集驗方

自九月十月服此永無驚恐

香附子

炒四錢

縮砂

炒三兩

甘草

炙一兩

右為細末米飲調二錢

損胎 附論

夫妊娠驚胎者是懷妊月將滿其胎神識已具或將產之時從高墜下傷損胞絡致血下胎動遂上搶心胃氣絕不醒其母面赤舌青口無沫出者兒死母活唇口俱青沫出者子母俱死面青舌赤沫出母死子活若下血不止胞燥胎枯令子死矣

方

桑寄生散

出危氏方

治妊娠或因房室驚觸勞力過度傷動

胞胎或食毒物致令子宮虛滑經血淋瀝若不急治

敗血湊心子母難保日漸胎乾危亡不久

桑寄生

當歸

去蘆酒浸

川續斷

川芎

香附

去毛炒

茯神

去木蛤粉炒

白朮

各一兩

人參

甘草

炙各半兩

陳艾葉

一兩烏梅

去核半兩

右剉散每服四錢水一盞半生薑五片煎不拘時服

龍骨散

出聖惠方

療婦人因損娠下血不止

方見墮胎門血出不止類

蟹爪湯

出千金方

治妊娠僵仆失據胎動轉上搶心甚者血

從口出逆不得息或注下血一斗五升胎不出子死

則寒熨人腹中急如產狀虛乏少氣困頓欲死煩悶

反覆服藥母得即安下血亦止其當產者立生并妊

娠兩兒一死一生服令死者出生者安

蟹爪升甘草

桂心

各二錢

阿膠

二兩或鹿角膠

右㕮咀以東流水一斗煮取三升去滓內膠烱盡服

能為一服佳不能者食頃再服若口急不能飲者格



口灌之藥下便活也與母俱生若胎已死獨母活也  
若不僵仆平安姙娠無有所見下血服此湯即止一  
方無桂心或云桂不安胎亦未信耳煎藥作東向竈  
用葦薪煮

竹茹酒

出大全良方

治姙娠誤有失墜損築胎損疼痛或八

九月者

青竹茹

二合好酒升

右煮三五沸分作三服即安

療婦人懷妊數傷胎

一名鯉魚臃方  
出大全良方

鯉魚二斤粳米一升

右如法作臃少着鹽多着葱豉醋食之甚良一月中  
須三遍作效安穩無忌一方有生薑無醋

芎藭散

出肘  
後方

治妊娠因墜倒仆胎不轉動腹內疼痛腰

重及子死腹中不出須臾三服立下

用川芎為細末以熱酒調服方寸匕日三四服立

出一方用熱水調服

治妊娠因失所胎動困絕千金方亦治子煩

出大金良方

取竹瀝飲一升立愈

製法云取淡竹斷兩頭節火燒中央器盛兩頭得汁取之

療損娠

用朱砂末一錢以生雞子三顆取白和朱砂頓服

胎若死即出如未死即安

治妊娠損動後腹痛

用冬麻子一升杵碎熬以水二升煮取汁熱沸分

為三四服

治孕婦胎損亦治白丹

用苧根濃煮水浴之日三四瘥

產寶方川芎黃耆湯

胎產急  
救方

治傷胎腹痛下黃汁

川芎

黃耆

等分

右劉每服五錢秫米炒一合水煎服

鄭氏勝金散

出永類  
鈴方

治妊娠因食傷胎傳於脾胃氣虛

冷逼小腹脹痛或腰重大便秘

吳茱萸

酒浸

陳皮

淨去  
白

川芎

乾薑

炮

生薑

切焙各  
一錢半

甘草 炙厚朴

薑製炒  
各三錢

右末每服三錢陳米飲下入鹽煎尤妙濟生加砂仁

治妊娠誤有失墜忽推築着疼痛

出本草方見本  
門前心腹疼痛類

竹茹湯

胎冷

附論

夫胎冷腹脹虛痛兩脇虛鳴臍下冷疼欲泄小便頻數  
大便虛滑者何荅曰胎氣既全子形成質或食瓜果甘  
甜飲冷不時之物當風取涼受不時之氣則令胎冷子

身不能安處皮毛疼痛筋骨拘急手足攣拳致使母有此危証急服安胎和氣散

方

安胎和氣散

出醫方集成

治胎冷腹脹虛痛兩脇虛鳴臍下

冷疼欲泄小便頻數大便虛滑

訶子

麴裏煨去核

白朮

各一兩

陳皮

去白

高良薑

炒

木香

不見火

白芍藥

甘草

炙各半兩

右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎七分去滓不

拘時服忌生冷

木香散

一名安胎和氣  
散出醫學類証

治胎冷成效

生薑 熟地黄 良薑 南木香 芍藥 陳皮

陳大米

各等分

右為細末每服二錢水一盞生薑三片煎八分通口服

當歸飲 治妊娘腹中冷胎不安

當歸

焙切

人參

生薑

切各七錢

厚朴

去粗皮生薑汁炙

陳皮

湯浸

去白焙

大棗

擘破五枚

右劉如麻豆大分為二劑以水四盞煎取一盞半去滓食前分二服如人行三五里再服也

漏胎

附論

夫妊娠漏胎者謂妊娠數月而經水時下也此由衝任脉虛不能約制手太陽少陰之經血也衝任之脉為經絡之海起於胞内手太陽小腸脉也手少陰心脉也是二經為表裏上為乳下為月水有娠之人經水所以斷者壅之養胎畜之以為乳汁也衝任氣虛則胞内泄不



能制其經血故月水時下亦名胞漏血盡則人斃矣又有因勞役喜怒哀樂不節飲食生冷觸冒風寒遂致胎動若母有宿疾子臟為風冷所乘氣血失度使胎不安故令下血也妊娠卒然有損動或冷熱不調和致傷於胎故卒痛而下血若不止之則墮胎也

方

阿膠湯 治妊娠胎漏下血不止

阿膠

炒燥

劉寄奴

赤石脂

黃連

去積

白龍骨

各一兩半

烏梅

五枚  
碎焙

桑寄生

甘菊花

當歸

切焙

旋覆花

炒

地榆

白朮

各一兩

枳殼

去瓢麩炒  
一兩二錢

艾葉

炒半兩

石膏

碎二兩

右粗搗篩每服五錢以水一盞半入生薑五片同煎  
八分不拘時服

續斷丸 治妊娠漏胎下血不止腹內疼痛夫妊娠將  
理失宜經血時下謂之漏胎由衝任虛弱不能固養  
胞胎故經血時下如器之漏也久漏不已則胎氣無

所稟養必致萎燥矣

續斷

附子

炮製去皮臍

蒲黃

乾薑

炮

芍藥

芎藭

山茱萸

各一兩半

肉蓯蓉

酒浸焙乾

白朮

兔絲子

酒浸焙別作

黃耆

炙剉

山芋

熟地黄

焙各二兩

右為末煉蜜和丸如桐子大每服二十九空心日晚

溫酒送下

截訶散

一名人參散出醫學類証

治胎未實或房室驚觸勞力過度

傷動胞胎或食毒物致子宮虛滑經血瀝淋若不急

治敗血湊心子母難保日漸胎乾危亡

人參

去蘆

黃耆

炙

阿膠

炒麵

甘草

炙

苧根

木香

不見火

青竹茹

芎藭

陳皮

去白

附子

炮

生薑

糯米

各等分

右為末每服二錢水一盞煎至八分通口服忌生冷

雞鴨魚麵

艾葉湯

治妊娠胎漏下血

艾葉

炒

黃芩

去黑心

黃連

去鬚

茯神

去木

桑耳

代赭石

厚朴

去粗皮生薑汁炙剉

白茅根

切

白芷

切

白芷

阿膠

炒各一兩

白朮

三錢

右粗搗篩每服五錢以水一盞半生薑五片煎至八

分去滓溫服不拘時

阿膠散

一名地榆散

治漏胎下血不止

方見墮胎後血出不止類

續斷飲

出大金良方

治妊娠漏胎下血不止臍腹疼痛

續斷

劉二兩

艾葉

去梗焙乾

熟地黃

焙

當歸

切焙各一兩

竹茹

新者

阿膠

炙燥雞蘇

去根莖各半兩

右為粗末每服三錢用水一盞煎七分去滓空心溫

服早晚各一

黃耆飲 治妊娠胎漏月水時下此由衝任脉虛不能  
制約太陽少陰之經故令血下蓋衝任之脉為經絡  
之海皆起於胞內今不能制其經血故為漏胎血乾  
則死

黃耆

剉

地榆

桑寄生

各一兩半

艾葉

半兩

白龍骨

研二兩

生地黃

二兩

生薑

半兩

右剉如麻豆大每服五錢以水一盞半煎取八分去  
滓食前服如人行三五里再服

熟乾地黄散

出聖惠方

治妊娠胎漏腹痛不止心神虛煩

熟地黄

人參

去蘆頭

芎藭

各二兩

阿膠

三兩搗碎炒令黃燥

白

龍骨

一兩當歸

三錢剉微炒

麥冬

三錢去心

右搗為散每服四錢以水一中盞入棗三枚煎六分

去滓食前溫服

榆白皮散

出和濟方

滑胎易產治妊娠漏胎去血及臨產驚

動太早產時未至穢露先下致使胞胎乾燥臨產艱

難並宜服之

白榆皮

葵根

一方用子瞿麥各一兩

大麻仁

去殼木通兩

川牛膝

三錢去苗酒浸切焙

右剉散每服三錢水一盞半煎溫服不拘時

竹茹寄生湯

出聖惠方

治妊娠漏胎心腹疼痛或時下血

竹茹

桑寄生

阿膠

炙艾葉

芍藥

白朮

各等分

右剉如麻豆大拌勻每服三錢以水一盞煎至七分

去滓溫服

薑黃湯

出聖惠方

治妊娠胎漏下血不止腹痛



薑黃

當歸

切焙

熟地黃

焙

艾葉

焙乾

鹿角膠

炒燥各一兩

右粗搗篩每服五錢以水一盞半入生薑半錢切棗

三枚擘破煎至八分去滓食前溫服

治妊娠胎漏腹痛不止心神虛煩

出聖惠方

熟地黃

二兩半

鹿茸

一兩半去毛塗酥炙微黃

鹿角膠

二兩搗碎炒令黃燥

艾葉

一兩微炒

苧麻根

一兩半剉

右為細散每於食前以米飲調下二錢

艾葉飲 治妊娠漏胎淋瀝不止

艾葉

陳者半兩

乾薑

炮

當歸

炙剉各三錢

芎藭

一兩

右粗末每服三錢以水一盞入生薑一棗大拍碎煎

七分去滓空心日午晚後各一一方治冷熱腹內不

調致胎不安無薑棗止用水煎

芎藭飲

治妊娠漏胎下血過多腹中刺痛止血安胎

方見諸

血類

桑寄生湯

治妊娠漏胎淋瀝下血臍腹疼痛

方見諸血類

膠艾湯

出大全良方

治妊娠漏胎下血過多亦治漏胎不安

阿膠

炙燥  
半兩

艾葉

焙乾  
一兩

右粗搗篩每服三錢以水一盞煎七分去滓溫服早  
晨午時晚間各一一方醋糊為丸如桐子大每服三  
十九空心米飲湯下名二氣丸

地黃散

出聖  
惠方

治妊娠胎漏下血不止腹痛又云治妊娠

下血如月信者若胞乾非特損子亦損母矣

熟地黃

焙

乾薑

炮各  
三錢

右為散每服二錢食前溫酒調下一方有赤石脂等

分同

油蜜煎

出便產  
須知

治胎氣因漏血乾澁難產者

清油

半  
兩  
好蜜  
一  
兩

右同煎數十沸溫服滑胎即下蓋緣無血胎乾所以難產他藥無益以此助血即效

二黃散

出保  
命集

治婦人有孕胎漏

生地黄

熟地黄

各等  
分

右為細末煎白朮枳殼湯調下二兩日二服

治妊娠血下如注名曰漏胞胞乾便死

出千金方

用生地黃半斤咬咀以清酒三升煮三沸絞去滓服一方加黃雌雞一頭治如食法一方取雞血和藥中服無時多服亦佳一方熟地黃為末以三指撮許酒服不過三服瘥

療妊娠數月日猶經水時時來者名曰漏胞若因房室勞有所去名曰傷胎

用赤小豆五升濕地種之令生牙乾之下篩懷身

數月日經水尚來以溫酒服方寸匕日三得效便  
停

治妊娠血下不止名曰漏胞血盡子死

用雞子十四枚取黃以好酒二升煮使如餲一服  
之未瘥更作服之以瘥為度

治妊娠胎漏非時下血方

出大全良方

熟地黄 桑寄生 續斷 人參

各半兩

艾葉

炙剉細

川芎 當歸 白朮

各一錢

右為細末每服三錢水一盞五分煎取一盞空心連  
滓服服兩盞不妨

苧麻湯 治漏胎無故下血腹痛不可忍或下黃汁稠  
如漆如小豆汁

野苧麻根

二兩  
剉炒

右以酒一椀水一椀加金銀花無則休用煎一椀服  
家種亦可用

鄭氏人參湯

出永類  
鈴方

治漏胎敗血湊心日漸胎乾子母

危困忌生冷雞鴨魚麵

人參

黃耆

炙

阿膠

炒

竹茹

木香

不見火

甘草

炙

附子

炮各半錢

川芎

錢一

陳皮

錢一

苧根

錢一

生薑

三錢

炮黑

右咬咀每服四錢糯米三七粒水煎熱服

尅效散

出朱氏集驗方

治漏胎

用五倍子一味為末酒調下

又方


出朱氏集驗方

用蓮子房燒化以麵糊丸湯酒任下



治妊娠下血不止名曰漏胎

取雞肝細剉以酒一升和服



普濟方卷三百四十二